

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) Numéro de publication: **0 428 434 A2**

(12)

# DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 90403125.9

(22) Date de dépôt: 06.11.90

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **C07D 211/14**, C07D 409/06,  
C07D 401/06, C07D 401/12,  
C07D 409/12, C07D 413/12,  
C07D 405/12, C07D 211/32,  
C07D 211/22, C07D 211/70,  
C07D 295/13

(30) Priorité: 06.11.89 FR 8914517  
15.06.90 FR 9007534

(43) Date de publication de la demande:  
22.05.91 Bulletin 91/21

(84) Etats contractants désignés:  
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Demandeur: **SANOFI S.A.**  
40, Avenue George V  
F-75008 Paris(FR)


(72) Inventeur: **Emonds-Ait, Xavier**  
La Balajade  
F-34980 Combaillaux(FR)

Inventeur: **Goulaouic, Pierre**  
224, avenue Jacques Cartes-Bât. A  
F-34000 Montpellier(FR)  
Inventeur: **Proletto, Vincenzo**  
1, Cour de Merle  
F-34680 St. Georges d'Orques(FR)  
Inventeur: **Van Broeck, Didier**  
367 avenue du Champ des Moulins  
F-34570 Murviel Les Montpellier(FR)

(74) Mandataire: **Gillard, Marie-Louise et al**  
Cabinet Beau de Loménie 55, Rue  
d'Amsterdam  
F-75008 Paris(FR)

(54) Composés aromatiques aminés et leurs énantiomères, procédé pour leur préparation et compositions pharmaceutiques les contenant.

(57) L'invention concerne des composés de formule




dans laquelle :

- m est un nombre entier de 1 à 3 ;
- Ar et Ar' représentent, indépendamment, un groupe thiényl, un groupe phényle substitué ou non substitué; un groupe imidazolyle; Ar' pouvant également être un groupe benzothiényl non substitué ou substitué par un halogène; un groupe naphthyle non substitué ou substitué par un halogène; un groupe biphényle; un indolyle non substitué ou substitué;
- X représente l'hydrogène;
- X' représente l'hydrogène, un groupe hydroxyle, ou est réuni à X'' ci-dessous pour former une liaison carbone-carbone;
- . ou bien X et X', ensemble, forment un groupe oxo ou dialkylaminoalkoxyimino de formule =N-O-(CH<sub>2</sub>)<sub>p</sub>-Am, où p est 2 ou 3 et Am est un groupe dialkylamino;

EP 0 428 434 A2

- Y représente un atome d'azote ou un groupe  $C(X'')$  où  $X''$  est l'hydrogène ou, avec  $X'$ , forme une liaison carbone-carbone;
- Q représente l'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_4$  ou un groupe aminoalkyle de formule  $-(CH_2)_q-Am'$ , où q est 2 ou 3 et  $Am'$  est un groupe pipéridino, benzyl-4 pipéridino ou dialkylamino;
- R représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe  $(CH_2)_n-L$ , où n est un nombre entier de 2 à 6 et L est l'hydrogène ou un groupe amino,
- T représente un groupe choisi parmi




W étant un atome d'oxygène ou de soufre, et

- Z représente soit l'hydrogène, soit M ou OM lorsque T représente le groupe



soit M lorsque T représente le groupe



M représente l'hydrogène ou un alkyle droit ou ramifié; un phénylalkyle non substitué ou substitué; un pyridylalkyle; un naphthylalkyle; un pyridylthioalkyle; un styryle; un (méthyl-1) imidazolyl-2 thioalkyle; un oxo-1 phénylindan-3 yle-2; un groupe aromatique ou hétéroaromatique non substitué ou substitué; ou un de leurs sels avec des acides minéraux ou organiques.

Application : antagonistes des récepteurs des neurokinines.

La présente invention a pour objet de nouveaux dérivés aromatiques substitués par un groupement amino et par diverses fonctions esters, amines ou amides, ainsi que leurs énantiomères.

La présente invention concerne également le procédé d'obtention des composés, qui peut être énantiosélectif et l'utilisation des composés selon l'invention dans des compositions à usage thérapeutique et plus particulièrement dans les phénomènes pathologiques qui impliquent le système des neurokinines comme : la douleur (D. REGOLI et al., Life Sciences, 1987, 40, 109-117), l'allergie et l'inflammation (J.E. MORLAY et al., Life Sciences, 1987, 41, 527-544), l'insuffisance circulatoire (J. LOSAY et al., 1977, Substance P, Von Euler, U.S. and Pernow ed., 287-293, Raven Press, New York), les troubles gastro-intestinaux (D. REGOLI et al., Trends Pharmacol. Sci., 1985, 6, 481-484), les troubles respiratoires (J. MIZRAHI et al., Pharmacology, 1982, 25, 39-50).


Des ligands endogènes aux récepteurs des neurokinines ont été décrits, telles la substance P (SP), la neurokinine A (NKA) (S.J. BAILEY et al., 1983, Substance P, P. Skrabanck ed., 16-17 Boole Press, Dublin) et la neurokinine B (NKB) (S.P. WATSON, Life Sciences, 1983, 25, 797-808).

Les récepteurs aux neurokinines ont été reconnus sur de nombreuses préparations et sont actuellement classés en trois types : NK<sub>1</sub>, NK<sub>2</sub> et NK<sub>3</sub>. Alors que la plupart des préparations étudiées jusqu'à maintenant, présentent plusieurs types de récepteurs, tel l'iléon de cobaye (NK<sub>1</sub>, NK<sub>2</sub> et NK<sub>3</sub>), certaines d'entre elles n'en possèderaient qu'un seul, telles l'artère carotide de chien (NK<sub>1</sub>), l'artère pulmonaire de lapin dépourvue d'endothélium (NK<sub>2</sub>) et la veine porte de rat (NK<sub>3</sub>) (D. REGOLI et al., Trends Pharmacol. Sci., 1988, 9, 290-295 et Pharmacology, 1989, 38, 1-15).

Une caractérisation plus précise des différents récepteurs est rendue possible par la synthèse récente d'agonistes sélectifs. Ainsi, la [Sar<sup>9</sup>, Met-(O<sub>2</sub>)<sup>11</sup>] SP, la [Nle<sup>10</sup>] NKA<sub>4-10</sub>, et la [Me Phe<sup>7</sup>] -NKB présenteraient une sélectivité respective pour les récepteurs NK<sub>1</sub>, NK<sub>2</sub> et NK<sub>3</sub> (cf D. REGOLI, 1988 et 1989 précédemment cité).

On a maintenant trouvé que certains composés aromatiques aminés possèdent des propriétés pharmacologiques intéressantes, en tant qu'antagonistes des récepteurs des neurokinines et sont notamment utiles pour le traitement de toute pathologie substance P et neurokinine dépendante.

Ainsi selon un de ses aspects, la présente invention concerne des dérivés aromatiques aminés de formule :



dans laquelle :

- m est un nombre entier de 1 à 3;
- Ar et Ar' représentent, indépendamment, un groupe thiényl ; un groupe phényle non substitué, mono ou di-substitué par un atome d'halogène, de préférence un atome de chlore ou de fluor, par un alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, par un trifluorométhyle, par un alcoxy dans lequel l'alkyle est en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, par un hydroxyle, par un méthylènedioxy ; un groupe imidazolyle; Ar' pouvant également être un groupe benzothiényl non substitué ou substitué par un halogène de préférence par un atome de chlore ou de fluor ; un groupe naphtyl non substitué ou substitué par un halogène de préférence par un atome de fluor; un groupe biphényle; un indolyle non substitué ou substitué sur l'azote par un groupe benzyle;
- X représente l'hydrogène;
- X' représente l'hydrogène, un groupe hydroxyle, ou est réuni à X'' ci-dessous pour former une liaison carbone-carbone ;  
ou bien X et X', ensemble, forment un groupe oxo ou dialkylaminoalkoxyimino de formule =N-O-(CH<sub>2</sub>)<sub>p</sub>-Am, où p est 2 ou 3 et Am est un groupe dialkylamino, chaque alkyle pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone;
- Y représente un atome d'azote ou un groupe C(X'') où X'' est l'hydrogène ou, avec X', forme une liaison carbone-carbone ;
- Q représente l'hydrogène, un groupe alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ou un groupe aminoalkyle de formule -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-Am', où q est 2 ou 3 et Am' est un groupe pipéridino, benzyl-4 pipéridino ou dialkylamino, chaque alkyle pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone;
- R représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-L, où n est un nombre entier de 2 à 6 et L est l'hydrogène ou un groupe amino, - T représente un groupe choisi parmi



5 et



10

W étant un atome d'oxygène ou de soufre, et


- Z représente soit l'hydrogène, soit M ou OM lorsque T représente le groupe

15



soit M lorsque T représente le groupe

20



M représente l'hydrogène ou un alkyle droit ou ramifié en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ; un phénylalkyle dans lequel le groupe  
 25 alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone, non substitué, mono ou polysubstitué sur le cycle  
 aromatique par un halogène, un hydroxy, un alcoxy de 1 à 4 atomes de carbone, un alkyle de 1 à 4 atomes  
 de carbone; un pyridylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un  
 naphtylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un pyridylthioalkyle  
 dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un styryle ; un (méthyl-1) imidazolyl-2  
 30 thioalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un oxo-1 phénylindan-3  
 yle-2 ; un groupe aromatique ou hétéroaromatique non substitué, mono ou polysubstitué ;  
 ou un de leurs sels avec des acides minéraux ou organiques.

Les sels des composés de formule (I) selon la présente invention comprennent aussi bien ceux avec  
 des acides minéraux ou organiques qui permettent une séparation ou une cristallisation convenable des  
 35 composés de formule (I), tels que l'acide picrique ou l'acide oxalique ou un acide optiquement actif, par  
 exemple un acide mandélique ou camphosulfonique, que ceux qui forment des sels pharmaceutiquement  
 acceptables tels que le chlorhydrate, le bromhydrate, le sulfate, l'hydrogénosulfate, le dihydrogénophospha-  
 te, le méthanesulfonate, le méthylsulfate, le maléate, le fumarate, le naphthalène-2 sulfonate, le glycolate, le  
 gluconate, le citrate, l'iséthionate.

40 De façon particulière, dans la formule (I), Z représente un groupe aromatique ou hétéroaromatique  
 mono-, di- ou tricyclique, pouvant porter un ou plusieurs substituants, dont un atome de carbone du  
 carbocycle aromatique ou de l'hétérocycle aromatique est directement lié au groupe T.

Plus particulièrement, le radical Z peut être un groupe phényle, qui peut être non substitué ou  
 éventuellement contenir un ou plusieurs substituants.

45 Lorsque Z est un groupe phényle, celui-ci peut être de préférence mono-ou disubstitué, notamment en  
 position 2,4, mais aussi par exemple en position 2,3, 4,5, 3,4 ou 3,5; il peut aussi être trisubstitué,  
 notamment en position 2,4,6, mais aussi par exemple en 2,3,4, 2,3,5 ou 2,4,5, 3,4,5; tétrasubstitué, par  
 exemple en 2,3,4,5; ou pentasubstitué. Les substituants du groupe phényle peuvent être: F; Cl; Br; I; CN;  
 OH; NH<sub>2</sub>; NH-CO-NH<sub>2</sub>; NO<sub>2</sub>; CONH<sub>2</sub>; CF<sub>3</sub>; alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>, de préférence en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, méthyle ou éthyle  
 50 étant préférés, ainsi que par exemple n-propyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, sec-butyle, tert.-butyle,  
 pentyle ou n-pentyle, hexyle ou n-hexyle, heptyle ou n-heptyle, octyle ou n-octyle, nonyle ou n-nonyle ainsi  
 que décyle ou n-décyle; alcényle contenant 2 à 10, de préférence 2-4 atomes de carbone, par exemple  
 vinyle, allyle, 1-propényle, isopropényle, butényle ou 1-butén-1-, -2-, -3- ou -4-yle, 2-butén-1-yle, 2-butén-2-  
 yle, pentényle, hexényle ou décényle; alcynyle contenant 2 à 10, de préférence 2-4 atomes de carbone, par  
 55 exemple éthyne, 1-propyn-1-yle, propargyle, butynyle ou 2-butyn-1-yle, pentynyle, décynyle; cycloalkyle  
 contenant 3 à 8, de préférence 5 ou 6 atomes de carbone, cyclopentyle ou cyclohexyle étant préférés, ainsi  
 que par exemple cyclopropyle, cyclobutyle, 1-, 2- ou 3-méthylcyclopentyle, 1-, 2-, 3- ou 4-méthylcyclohexy-  
 le, cycloheptyle ou cyclooctyle; bicycloalkyle contenant 4 à 11, de préférence 7 atomes de carbone, exo ou

endo 2-norbornyle étant préférés, ainsi que par exemple 2-isobornyle ou 5-camphyle; hydroxyalkyle contenant 1 à 5, de préférence 1-2 atomes de carbone, hydroxyméthyle et 1- ou 2-hydroxyéthyle étant préférés, ainsi que par exemple 1-hydroxyprop-1-yle, 2-hydroxyprop-1-yle, 3-hydroxyprop-1-yle, 1-hydroxyprop-2-yle, 1-hydroxybut-1-yle, 1-hydroxypent-1-yle; alcoxy contenant 1 à 10, de préférence 1-4 atomes de carbone, méthoxy ou éthoxy étant préférés, ainsi que par exemple n-propoxy, isopropoxy, n-butoxy, isobutoxy, sec-butoxy, tert-butoxy, pentyloxy, hexyloxy, heptyloxy, octyloxy, nonyloxy ou décylloxy; alcoxyalkyle contenant 2 à 10, de préférence de 2 à 6 atomes de carbone, par exemple alcoxyméthyle ou alcoxyéthyle, tel que méthoxyméthyle ou 1- ou 2-méthoxyéthyle, 1- ou 2-n-butoxyéthyle, 1- ou 2-n-octyloxyéthyle; alcoxyalcoxyalkyle contenant jusqu'à 10, de préférence de 4 à 7 atomes de carbone, par exemple alcoxyalcoxyméthyle, par exemple 2-méthoxyéthoxyméthyle, 2-éthoxyéthoxyméthyle ou 2-isopropoxyéthoxyméthyle, alcoxyalcoxyéthyle par exemple 2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle ou 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle; alcoxyalcoxy contenant de 2 à 10, de préférence de 3 à 6 atomes de carbone, par exemple 2-méthoxyéthoxy, 2-éthoxyéthoxy ou 2-n-butoxyéthoxy; alcényloxy contenant 2 à 10, de préférence 2 à 4 atomes de carbone, allyloxy étant préféré, ainsi que par exemple vinyloxy, propényloxy, isopropényloxy, butényloxy tel que 1-butén-1-, -2-, -3- ou -4-yloxy, 2-butén-1-yloxy, 2-butén-2-yloxy, pentényloxy, hexényloxy ou décényloxy; alcényloxyalkyle avec jusqu'à 10, de préférence 3-6 atomes de carbone, par exemple allyloxyméthyle; alcynyloxy contenant de 2 à 10, de préférence 2 à 4 atomes de carbone, propargyloxy étant préféré, ainsi que par exemple éthynyloxy, 1-propyn-1-yloxy, butynyloxy ou 2-butyln-1-yloxy, pentynyloxy ou décynyloxy; alcynyloxyalkyle contenant de 3 à 10, de préférence 3 à 6 atomes de carbone, par exemple éthynyloxyméthyle, propargyloxyméthyle ou 2-(2-butyln-1-yloxy)éthyle; cycloalcoxy contenant 3 à 8, de préférence 5 ou 6 atomes de carbone, cyclopentyloxy ou cyclohexyloxy étant préférés, ainsi que par exemple cyclopropyloxy, cyclobutyloxy, 1-, 2- ou 3-méthylcyclopentyloxy, 1-, 2-, 3- ou 4-méthylcyclohexyloxy, cycloheptyloxy ou cyclooctyloxy; alkylthio contenant de 1 à 10, de préférence 1 à 4 atomes de carbone, méthylthio ou éthylthio étant préférés, ainsi que par exemple n-propylthio, isopropylthio, n-butylthio, isobutylthio, sec-butylthio, tert-butylthio, pentylthio, hexylthio, octylthio, nonylthio ou décylthio; alkylthioalkyle contenant de 2 à 10, de préférence 2 à 6 atomes de carbone, par exemple méthylthiométhyle, 2-méthylthioéthyle ou 2-n-butylthioéthyle; acylamino, à savoir alcanoylamino contenant de 1 à 7, de préférence 1 à 4 atomes de carbone, formylamino et acétylamino étant préférés, ainsi que propionylamino, butyrylamino, isobutyrylamino, valérylamino, caproylamino, heptanoylamino, ainsi que aroylamino ou benzoylamino; acylaminoalkyle, de préférence alcanoylaminoalkyle contenant de 2 à 8, de préférence 3 à 6 atomes de carbone, tel que formylaminoéthyle, acétylaminoéthyle, propionylaminoéthyle, n-butyrylaminoéthyle, formylaminopropyle, acétylaminopropyle, propionylaminopropyle, formylaminobutyle, acétylaminobutyle, ainsi que propionylaminobutyle, butyrylaminobutyle; acyloxy contenant de 1 à 6, de préférence 2 à 4 atomes de carbone, acétyloxy, propionyloxy ou butyryloxy étant préférés, ainsi que par exemple formyloxy, valéryloxy, caproyloxy; alcoxycarbonyle contenant de 2 à 5, de préférence 2 et 3 atomes de carbone, méthoxycarbonyle et éthoxycarbonyle étant préférés, ainsi que par exemple n-propoxycarbonyle, isopropoxycarbonyle, n-butoxycarbonyle, isobutoxycarbonyle, sec-butoxycarbonyle ou tert-butoxycarbonyle; cycloalcoxycarbonyle contenant de 4 à 8, de préférence 6 ou 7 atomes de carbone, cyclopentyloxycarbonyle, cyclohexyloxycarbonyle étant préférés, ainsi que cyclopropyloxycarbonyle, cyclobutyloxycarbonyle ou cycloheptyloxycarbonyle; alkylaminocarbonylamino contenant de 2 à 4 atomes de carbone, tel que méthylaminocarbonylamino, éthylaminocarbonylamino, propylaminocarbonylamino; dialkylaminocarbonylamino contenant de 3 à 7, de préférence 3 à 5 atomes de carbone, de préférence diméthylaminocarbonylamino, ainsi que di-n-propylaminocarbonylamino, diisopropylaminocarbonylamino; (1-pyrrolidino)-carbonylamino; (1-pipéridino)-carbonylamino; cycloalkylaminocarbonylamino contenant de 4 à 8, de préférence 6 ou 7 atomes de carbone, cyclopentylaminocarbonylamino, cyclohexylaminocarbonylamino étant préférés, ainsi que cyclopropylaminocarbonylamino, cyclobutylaminocarbonylamino, cycloheptylaminocarbonylamino, alkylaminocarbonylaminoalkyle contenant de 3 à 9, de préférence 4 à 7 atomes de carbone, méthylaminocarbonylaminoéthyle, éthylaminocarbonylaminoéthyle, éthylaminocarbonylaminopropyle, éthylaminocarbonylaminobutyle étant préférés, ainsi que par exemple méthylaminocarbonylaminométhyle, n-propylaminocarbonylaminobutyle, n-butylaminocarbonylaminobutyle; dialkylaminocarbonylaminométhyle contenant de 4 à 11 atomes de carbone, par exemple diméthylaminocarbonylaminométhyle, diéthylaminocarbonylaminométhyle, diéthylaminocarbonylaminopropyle, diéthylaminocarbonylaminobutyle; (1-pyrrolidino)-carbonylaminométhyle; (1-pipéridino)-carbonylaminométhyle; cycloalkylaminocarbonylaminométhyle contenant de 5 à 12, de préférence 8 à 11 atomes de carbone, cyclopentylaminocarbonylaminométhyle, cyclopentylaminocarbonylaminopropyle, cyclopentylaminocarbonylaminobutyle, cyclohexylaminocarbonylaminométhyle, cyclohexylaminocarbonylaminopropyle et cyclohexylaminocarbonylaminobutyle étant préférés, ainsi que par exemple cyclopropylaminocarbonylaminométhyle, cycloheptylaminocarbonylaminométhyle; alcoxycarbonylaminométhyle contenant de 3 à 12, de préférence 4 à 9 atomes de carbone, méthoxycarbonylaminométhyle, éthoxycarbonylaminométhyle

thyle, n-propoxycarbonylaminooéthyle, isopropoxycarbonylaminooéthyle, n-butoxycarbonylaminooéthyle, isobutoxycarbonylaminooéthyle, sec-butoxycarbonylaminooéthyle, tert-butoxycarbonylaminooéthyle, éthoxycarbonylaminopropyle, n-butoxycarbonylaminopropyle, éthoxycarbonylaminobutyle, n-butoxycarbonylaminobutyle étant préférés, ainsi que par exemple n-propoxycarbonylaminopropyle, n-propoxycarbonylaminobutyle, 5 isopropoxycarbonylaminobutyle; cycloalcoxycarbonylaminooalkyle contenant de 5 à 12, de préférence 8 à 11 atomes de carbone, cyclopentylloxycarbonylaminooéthyle, cyclopentylloxycarbonylaminopropyle, cyclopentylloxycarbonylaminobutyle, cyclohexylloxycarbonylaminooéthyle, cyclohexylloxycarbonylaminopropyle, cyclohexylloxycarbonylaminobutyle étant préférés, ainsi que par exemple cyclopropylloxycarbonylaminométhyle, cycloheptyloxycarbonylaminooéthyle, carbamoylalkyle contenant de 2 à 5, de préférence 2 atomes de 10 carbone, de préférence carbamoylméthyle, ainsi que carbamoyléthyle, carbamoylpropyle, carbamoylbutyle; alkylaminocarbonylalkyle contenant de 3 à 9, de préférence 3 à 6 atomes de carbone, méthylaminocarbonyléthyle, éthylaminocarbonylméthyle, n-propylaminocarbonylméthyle, isopropylaminocarbonylméthyle, n-butylaminocarbonylméthyle, isobutylaminocarbonylméthyle, sec-butylaminocarbonylméthyle, tert-butylaminocarbonylméthyle étant préférés, ainsi que par exemple éthylaminocarbonyléthyle, éthylaminocarbonylpro- 15 pyle, éthylaminocarbonylbutyle, n-propylaminocarbonylbutyle, n-butylaminocarbonylbutyle; dialkylaminocarbonylalkyle contenant de 4 à 11, de préférence 4 à 8 atomes de carbone, diméthylaminocarbonylméthyle, diéthylaminocarbonylméthyle, di-n-propylaminocarbonylméthyle; ainsi que par exemple diéthylaminocarbonyléthyle, diéthylaminocarbonylpropyle, diéthylaminocarbonylbutyle; (1-pyrrolidino) carbonylméthyle ; (1-pipéridino) carbonylméthyle; (1-pipéridino) carbonyléthyle; cycloalkylaminocarbonylalkyle contenant de 5 à 20 12, de préférence 7 ou 8 atomes de carbone, cyclopentylaminocarbonylméthyle et cyclohexylaminocarbonylméthyle étant préférés, ainsi que par exemple cyclopropylaminocarbonylméthyle, cyclobutylaminocarbonylméthyle, cycloheptylaminocarbonylméthyle, cyclohexylaminocarbonyléthyle, cyclohexylaminocarbonylpropyle, cyclohexylaminocarbonylbutyle; alkylaminocarbonylalkoxy contenant de 3 à 10, de préférence 3 à 5 atomes de carbone, méthylaminocarbonylméthoxy étant préféré, ainsi que par exemple méthylaminocarbonyléthoxy, méthylaminocarbonylpropoxy; dialkylaminocarbonylalkoxy contenant de 4 à 10, de préférence 25 4 à 7 atomes de carbone, tel que diméthylaminocarbonylméthoxy, diéthylaminocarbonyléthoxy, (pipéridinyl)carbonylméthoxy; cycloalkylaminocarbonylalkoxy contenant de 5 à 11, de préférence 7 ou 8 atomes de carbone, tel que cyclopentylaminocarbonylméthoxy, cyclohexylaminocarbonylméthoxy.

Le groupe Z est avantageusement un groupe phényle ; un groupe benzyle ; un groupe benzoyle ; un  
30 groupe phénylthioalkyle dans lequel l'alkyle est en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>.


Le groupe phényle Z est de préférence mono ou disubstitué par un halogène, le groupe 2,4-dichlorophényle étant particulièrement préféré.

Le radical Z peut également représenter un groupe aromatique bicyclique tel que le 1- ou 2-naphtyle; 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-indényle; dont une ou plusieurs liaisons peuvent être hydrogénées, lesdits groupes 35 pouvant être non substitués ou contenir éventuellement un ou plusieurs substituants tel que : un halogène et plus particulièrement un atome de fluor, le groupe alkyle, phényle, cyano, hydroxyalkyle, hydroxy, oxo, alkylcarbonylamino et alcoycarbonyl, thioalkyle dans lesquels les alkyles sont en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>.

Le radical Z peut être aussi un groupe pyridyle, thiadiazolyle, indolyle, indazolyle, imidazolyle, benzimidazolyle, benzotriazolyle, benzofurannyle, benzothiényl, benzothiazolyle, benzisothiazolyle, quinoly-  
40 le, isoquinolyle, benzoxazolyle, benzisoxazolyle, benzoxazinyle, benzodioxinyle, isoxazolyle, benzopyranny-  
le, thiazolyle, thiényl, furyl, pyrannyle, chroményl, isobenzofurannyle, pyrrolyl, pyrazolyle, pyrazinyle,  
pyrimidinyle, pyridazinyle, indoliziny, phtalazinyle, quinazolinyle, acridinyle, isothiazolyle, isochromannyle,  
chromannyle, dont une ou plusieurs doubles liaisons peuvent être hydrogénées, lesdits groupes pouvant  
être non substitués ou contenir éventuellement un ou plusieurs substituants tels que : le groupe alkyle,  
45 phényle, cyano, hydroxyalkyle, hydroxy, alkylcarbonylamino et alcoxycarbonyl, thioalkyle dans lesquels les  
alkyles sont en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>.


Selon un autre de ses aspects, la présente invention concerne un procédé pour la préparation de composés aromatiques aminés différemment substitués de formule (I) et de leurs sels, caractérisé en ce que

50 a) on traite une amine libre de formule :




dans laquelle  $m$ ,  $Ar'$  et  $Q$  sont tels que définis précédemment;  $R^*$  représente l'hydrogène, un groupe

méthyle ou un groupe  $(CH_2)_n-L^*$ , où n, est tel que défini précédemment et  $L^*$  est l'hydrogène ou un groupe amino protégé par un groupe N-protecteur ; et E représente un groupe hydroxy, un groupe O-protégé tel que tétrahydropyranyl-2 oxy, ou un groupe




dans lequel Ar, X et Y sont tels que définis précédemment et  $X^{\circ}$  représente le groupe  $X'$ , tel que défini précédemment, dans lequel le groupe hydroxy est protégé par un groupe O-protecteur;

- soit avec un dérivé fonctionnel d'un acide de formule :




dans laquelle Z est tel que défini précédemment, lorsqu'on doit préparer un composé de formule (I) où T est  $-\text{CO}-$ ,


- soit avec un iso(thio)cyanate de formule :



dans laquelle W et Z sont tels que définis précédemment, lorsqu'on doit préparer un composé de formule (I) où T est




pour former le composé de formule :




b) puis, lorsque E représente le tétrahydropyranyloxy, on élimine le groupe tétrahydropyranyle par hydrolyse acide, l'hydrolyse pouvant alternativement avoir lieu à l'étape (a) sur l'amine de départ de formule (II),

c) on traite l'alcanolamine N-substituée ainsi obtenue de formule :



avec le chlorure de méthanesulfonyle et,

d) on fait réagir le mésylate ainsi obtenu de formule :



avec une amine secondaire de formule :



5

dans laquelle Ar, Y, X et X' sont tels que définis précédemment

e) on élimine les groupes O-protecteur et N-protecteur éventuels et on transforme éventuellement le produit ainsi obtenu en un de ses sels.

- 10 Comme dérivé fonctionnel de l'acide (III), on utilise l'acide lui-même, convenablement activé par exemple par le cyclohexylcarbodiimide ou par l'hexafluorophosphate de benzotriazolyl N-oxytrisdiméthylaminophosphonium (BOP), ou bien un des dérivés fonctionnels qui réagissent avec les amines, par exemple un anhydride, un anhydride mixte, le chlorure ou un ester activé. Lorsque Z est un groupe OM, l'acide concerné est l'acide carbonique et, comme dérivé fonctionnel, on utilise le monochlorure, à savoir un


15 chloroformiate Cl-CO-OM.

Les groupes N-protecteurs éventuellement présents dans le groupe R' du composé de la formule (II) sont les groupes N-protecteurs classiques bien connus de l'homme de l'art et de préférence ceux qui sont éliminables par hydrolyse acide, tels que le groupe trityle et méthoxytrityle.

- 20 Les groupes O-protecteurs éventuellement présents dans le groupe X' sont également les groupes O-protecteurs classiques bien connus de l'homme de l'art et de préférence ceux qui sont éliminables par hydrolyse acide douce, tels que les groupes tétrahydropyranyle-2, t-butyldiméthylsilyle et méthoxyméthyle.

Lorsque comme produit de départ on utilise un composé de formule (II) où E représente un groupe


25




- 30 le procédé de la présente invention peut être représenté et illustré en détail par le Schéma 1 ci-après :

SCHEMA 1


35





40



45



50



55

Dans la formule (IIIa) ci-dessus, on considère le chlorure d'acide comme dérivé fonctionnel réactif de l'acide (III). Le chlorure d'acide est utilisé lorsque l'on désire préparer un composé (I') où Z est OM. La



réaction avec le chlorure d'acide est effectuée dans un solvant inerte, tel que le dichlorométhane ou le benzène en présence d'une base telle que par exemple la triéthylamine, à température ambiante.

Dans le cas particulier de  $Z = OM$ , la réaction du composé (II') avec le chloroformiate de formule :



10 est effectuée selon les méthodes habituelles.

Lorsque  $Z$  est autre que  $OM$ , on peut utiliser un autre dérivé fonctionnel ou on peut partir de l'acide libre (III) en réalisant un couplage de (II') avec le BOP (hexafluorophosphate de benzotriazolyl N-oxytrisdiméthylaminophosphonium), puis en additionnant l'acide (III) en présence d'une base organique comme par exemple la triéthylamine, dans un solvant comme le dichlorométhane ou le diméthylformamide, à température ambiante, les composés (I') obtenus étant isolés et purifiés selon les méthodes habituelles, 15 comme par exemple la chromatographie ou la recristallisation.

On peut faire aussi réagir (II') avec un iso(thio)cyanate  $W = C = N - Z$  (III') dans un solvant inerte anhydre tel que par exemple le benzène, pendant une nuit à température ambiante puis traiter le mélange réactionnel selon les méthodes habituelles pour obtenir les composés (I'').

20 Lorsque comme produit de départ on utilise un composé de formule (II) où  $E$  représente un groupe tétrahydropyranyloxy, le procédé de la présente invention peut être représenté et illustré à partir du Schéma 2.

Les réactions du composé (II'') avec les réactifs (IIIa) et (III') se déroulent comme décrit ci-dessus pour le Schéma 1, le chlorure d'acide (IIIa) pouvant être remplacé par un autre dérivé fonctionnel ou par l'acide libre activé par exemple par le BOP.

25 L'intermédiaire (IV') ainsi obtenu est déprotégé par hydrolyse acide pour conduire au composé hydroxylé libre (V). La déprotection par hydrolyse du groupe tétrahydropyranyloxy peut être effectuée directement sur le composé (II''). On obtient ainsi le composé hydroxylé (II'') qui est mis en réaction directement avec les réactifs (IIIa) ou (III') comme décrit dans le Schéma 2 ci-dessous pour fournir le composé (V). On prépare ensuite le mésylate (VI) pour le substituer par une amine secondaire de formule 30 (VII) pour obtenir finalement, après déprotection éventuelle de l'amine  $L^*$ , les composés (I) selon l'invention.

35


40

45


50

55

## SCHEMA 2



Lorsque le produit obtenu à la fin de la réaction entre le composé de formule (II) et le composé (III)  
 55 (comme dérivé fonctionnel) ou (III'), a la formule IV où E représente un groupe



5

où Ar, X, X<sup>°</sup> et Y sont tels que définis ci-dessus, le produit peut soit représenter le produit final soit présenter un groupe hydroxy O-protégé (dans X<sup>°</sup>) ou un groupe amino protégé (L<sup>°</sup>) ou les deux. Dans ce dernier cas, il est souhaitable d'utiliser, dans le produit de départ (II), des groupes O-protecteurs et N-protecteurs pouvant être hydrolysés en même temps.

La déprotection est effectuée selon les méthodes connues; notamment, si l'on utilise, comme groupe O-protecteur, un groupe tétrahydropyranyle, l'hydrolyse peut être effectuée en conditions douces avec de l'acide p-toluènesulfonique dilué. Si la molécule du produit (IV) contient à la fois un groupe tétrahydropyranyloxy et un groupe tritylamino, l'hydrolyse du premier peut être ainsi effectuée en respectant le groupe N-protecteur, alors que l'acide formique libère en même temps les deux groupes protecteurs.

Les produits de formule (I) ainsi obtenus sont isolés, sous forme de base libre ou de sel, selon les techniques classiques.

Lorsque le composé de formule (I) est obtenu sous forme de base libre, la salification est effectuée par traitement avec l'acide choisi dans un solvant organique. Par traitement de la base libre, dissoute par exemple dans un alcool tel que l'isopropanol, avec une solution de l'acide choisi dans le même solvant, on obtient le sel correspondant qui est isolé selon les techniques classiques. Ainsi, on prépare par exemple le chlorhydrate, le bromhydrate, le sulfate, l'hydrogénosulfate, le dihydrogénophosphate, le méthanesulfonate, le méthylsulfate, l'oxalate, le maléate, le fumarate, le naphthalène-2 sulfonate.

A la fin de la réaction, les composés de formule (I) peuvent être isolés sous forme d'un de leurs sels, par exemple le chlorhydrate ou l'oxalate; dans ce cas, s'il est nécessaire, la base libre peut être préparée par neutralisation dudit sel avec une base minérale ou organique, telle que l'hydroxyde de sodium ou la triéthylamine ou avec un carbonate ou bicarbonate alcalin, tel que le carbonate ou bicarbonate de sodium ou de potassium.

La résolution des mélanges racémiques (I) permet d'isoler les énantiomères qui font partie de l'invention.

On peut aussi effectuer le dédoublement de mélanges racémiques des produits de formule (II), notamment des produits de formule (II') et (II'') ou de leurs précurseurs, afin de préparer les énantiomères des produits de formule (I).

Les composés de départ de formule (II) sont préparés à partir de nitriles de formule :

35




40

dans laquelle m, E, Q et Ar' sont tels que définis ci-dessus, par réduction et alkylation éventuelle de l'amine obtenue.


Pour la préparation des composés de formule (II) où R<sup>°</sup> est l'hydrogène, les nitriles de départ de formule (VIII) sont soumis à une hydrogénation dans un alcool tel que l'éthanol, en présence d'un catalyseur tel que par exemple le nickel de Raney et l'amine libre primaire peut être isolée selon les méthodes classiques.

Lorsqu'on souhaite préparer les composés de formule (II) où R<sup>°</sup> est méthyle, on traite l'amine libre, obtenue par hydrogénation du nitrile (VIII) comme décrit ci-dessus, avec un chloroformiate, par exemple avec le chloroformiate de formule Cl-CO-OAlk, où Alk est un alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, de préférence éthyle, pour obtenir les carbamates de formule :

55




qui sont ensuite réduits par des moyens connus, tels que l'action d'un agent réducteur comme par exemple un hydrure métallique, tel que l'hydrure de sodium et d'aluminium, l'hydrure de lithium et d'aluminium ou par un hydrure du bore, tel que le diméthylsulfure de borane. La réduction est réalisée dans un solvant, tel que l'éther ou le toluène à une température comprise entre la température ambiante et 60°C. La méthylamine ainsi obtenue de formule :




est isolée selon les méthodes habituelles.

Pour préparer les composés de formule (II) où  $\text{R}^\circ$  est un groupe  $-(\text{CH}_2)_n-\text{L}^\circ$ , où  $n$  et  $\text{L}^\circ$  sont tels que définis ci-dessus, on traite l'amine libre, obtenue par hydrogénation du nitrile (VIII) comme décrit ci-dessus, avec un dérivé fonctionnel réactif de l'acide de formule :




pour obtenir un amide de formule :




dans laquelle  $m$ ,  $n$ ,  $\text{E}$ ,  $\text{Ar}'$ ,  $\text{Q}$  et  $\text{L}^\circ$  sont tels que définis ci-dessus.


L'amide (X), par réduction dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus pour le nitrile (VIII), donne le composé désiré de formule :



Les nitriles de formule (VIII), sont préparés à partir de nitriles connus, commerciaux ou préparés selon des méthodes connues, de formule :



qui par alkylation avec un composé de formule :




dans laquelle  $m$  et  $\text{E}$  sont tels que définis ci-dessus et  $\text{J}$  est un atome d'halogène, par exemple de brome ou un groupe hydroxy, donnent les composés (VIII) désirés.

La synthèse des nitriles de formule (VIII) où  $\text{E}$  est un groupe tétrahydropyranyloxy est réalisée à partir d'un dérivé tétrahydropyranyloxy (THP-O-) obtenu par réaction entre un alcool de formule  $\text{Br}-(\text{CH}_2)_m-\text{OH}$  avec  $m$  tel que défini précédemment et le dihydropyrane pour conduire au composé




qui est ensuite additionné, en présence d'hydrure alcalin sur le dérivé acétonitrile (XI) pour préparer l'intermédiaire,




correspondant aux composés de formule (VIII) qui sont des précurseurs intermédiaires des composés (II') du schéma 1 ci-dessus, où Q est l'hydrogène, lequel peut ensuite être alkylé.

La synthèse des nitriles de formule (VIII) où E représente un groupe



où Ar, X, X° et Y sont tels que définis précédemment, est effectuée selon des méthodes connues par addition sur des dérivés chlorés de formule :




d'un dérivé nitrile de formule :




en présence d'amidure de sodium dans un solvant tel que le toluène à des températures comprises entre 30 et 80°C.

Le dérivé chloré (XIII) est préparé par action d'un réactif chlorant tel que par exemple le chlorure de thionyle sur le dérivé hydroxylé de formule :




lui même préparé à partir de l'amine de formule :



sur laquelle on fait réagir, si m = 2, l'oxyde d'éthylène et si m = 3, un halogéno-3 propanol.


Les amines (II) sont des produits nouveaux qui constituent les intermédiaires clés pour la préparation des composés de formule (I) ci-dessus. De plus, on a trouvé de façon surprenante que les amines de formule (II') sont douées, comme les composés de formule (I), bien qu'à un degré inférieur, d'une bonne activité antagoniste des récepteurs des neurokinines. L'activité de ces composés s'étend aux dérivés déprotégés selon les méthodes classiques rappelées plus haut (X° = X' et R° = R).

Ainsi, selon un autre de ses aspects, la présente invention concerne des composés de formule :



dans laquelle :

-  $E^{\circ\circ}$  représente un groupe tétrahydropyranyloxy, un groupe hydroxy, ou un groupe



- m est un nombre entier de 1 à 3 ;

- Ar et Ar' représentent, indépendamment, un groupe thiényle ; un groupe phényle non substitué, mono ou di-substitué par un atome d'halogène, de préférence un atome de chlore ou de fluor, par un alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, par un trifluorométhyle par un alcoxy dans lequel l'alkyle est en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, par un hydroxyle, par un méthylènedioxy ; un groupe imidazolyle ; Ar' pouvant être un groupe benzothiényne non substitué ou substitué par un halogène de préférence par un atome de chlore ou de fluor ; un groupe naphthyle non substitué ou substitué par un halogène de préférence par un atome de fluor ; un groupe biphényle ; un indolyne non substitué ou substitué sur l'azote par un groupe benzyle ;

- X représente l'hydrogène ;

-  $X^{\circ\circ}$  représente l'hydrogène, un groupe hydroxyle libre ou protégé par un groupe O-protecteur, ou est réuni à X ci-dessous pour former une liaison carbone-carbone,

ou bien X et  $X^{\circ\circ}$ , ensemble, forment un groupe oxo ou dialkylaminoalkoxyimino de formule =N-O-(CH<sub>2</sub>)<sub>p</sub>-Am, où p est 2 ou 3 et Am est un groupe dialkylamino, chaque alkyle pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone ;

- Y représente un atome d'azote ou un groupe C(X'') où X'' est l'hydrogène ou, avec  $X^{\circ\circ}$ , forme une liaison carbone-carbone ;

- Q représente l'hydrogène, un groupe alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ou un groupe aminoalkyle de formule -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-Am', où q est 2 ou 3 et Am' est un groupe pipéridino, benzyl-4 pipéridino ou dialkylamino, chaque alkyle pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone ;


-  $R^{\circ\circ}$  représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-L'', où n est un nombre de 2 à 6 et L'' est l'hydrogène ou un groupe amino libre ou protégé par un groupe N-protecteur ; ou un de leurs sels.

Les composés de formule XVI comprennent les composés de formule II qui sont des composés protégés, ainsi que les composés déprotégés correspondants.

Ils sont obtenus selon le procédé indiqué précédemment pour les composés de formule (II), chaque étape étant suivie de l'élimination éventuelle des groupes N- et O-protecteurs. Ils peuvent ensuite être transformés en des sels avec des acides optiquement actifs, ce qui permet d'obtenir des composés optiquement purs.

Les composés de formule (XVI) particulièrement préférés sont ceux dans lesquels  $E^{\circ\circ}$  représente un groupe hydroxy et  $R^{\circ\circ}$  représente l'hydrogène ; ces composés ainsi que leurs énantiomères correspondent aux composés de formule (II').


Les intermédiaires de formule (IV), où E représente tétrahydropyranyloxy, ainsi que les intermédiaires de formule (V) et de formule (VI) sont des produits nouveaux particulièrement intéressants et représentent un aspect ultérieur de la présente invention. Ces produits, ainsi que les composés correspondants dont les groupes O- et N-protecteurs ont été éliminés par des méthodes classiques, peuvent être regroupés dans la formule (V') suivante :



5

dans laquelle :

- m est un nombre entier de 1 à 3 ;
- G est l'hydrogène, un groupe tétrahydropyranyle, ou un groupe méthanesulfonyle ;
- 10 - Ar' représente un groupe thiényle; un groupe phényle non substitué, i mono ou di-substitué par un atome d'halogène, de préférence un atome de chlore ou de fluor ou par un groupe trifluorométhyle; par un alcoxy dans lequel l'alkyle est en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, par un hydroxyle ; un groupe benzothiényne non substitué ou substitué par un halogène ; un groupe naphthyle non substitué ou substitué par un halogène, de préférence un atome de fluor ; ou un groupe biphényle; un groupe indolyne non substitué ou substitué sur l'azote par un benzyle
- 15 ;
- Q représente l'hydrogène ou un groupe aminoalkyle de formule -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-Am', où q est 2 ou 3 et Am' est un groupe pipéridino, benzyl-4 pipéridino ou dialkylamino, chaque alkyle pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone;
- R<sup>°°</sup> représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-L<sup>°°</sup>, où n est un nombre entier de
- 20 2 à 6 et L<sup>°°</sup> est l'hydrogène ou un groupe amino libre ou protégé par un groupe N-protecteur ;
- T représente un groupe choisi parmi



25

W étant un atome d'oxygène ou de soufre,


- Z représente soit l'hydrogène, soit M ou OM lorsque T représente le groupe

30



soit M lorsque T représente le groupe

35



40


M représente l'hydrogène ou un alkyle droit ou ramifié en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ; un phénylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone, non substitué, mono ou polysubstitué sur le cycle aromatique par un halogène, un hydroxy, un alcoxy de 1 à 4 atomes de carbone, un alkyle de 1 à 4 atomes de carbone; un pyridylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un naphthylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un pyridylthioalkyle

45

dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un styryle ; un (méthyl-1) imidazolyl-2 thioalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un oxo-1 phénylindan-3 yle-2 ; un groupe aromatique ou hétéroaromatique non substitué, mono ou polysubstitué; et leurs sels avec des acides minéraux ou organiques.

Les composés de formule (V') sont des produits nouveaux. Ces composés sont préparés selon les étapes a), b) et c) du procédé décrit plus haut pour la préparation des composés de formule (I), suivies de l'élimination éventuelle des groupes N-protecteurs après chaque étape, en utilisant comme produit de départ une amine libre de formule :

55




dans laquelle G, m, Q et Ar' sont tels que définis ci-dessus, et R\* représente l'hydrogène, un groupe méthyle, ou un groupe (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-L\* où n est un nombre entier de 2 à 6 et L\* est l'hydrogène ou un groupe amino protégé par un groupe N-protecteur.

Comme indiqué ci-dessus, les intermédiaires qui sont susceptibles de donner des sels avec des acides optiquement actifs peuvent être résolus afin de permettre la préparation des énantiomères des composés de formule (I).

On peut également prévoir la synthèse stéréospécifique d'intermédiaires qui ne donnent pas de sel permettant la séparation.

Un intermédiaire particulièrement adapté pour une telle synthèse stéréospécifique est l'alcool de formule (V) ci-dessus.


Ainsi, selon un autre de ses aspects, la présente invention concerne les énantiomères et un procédé pour la préparation des énantiomères des composés de formule (I) et de leurs sels ; lesdits énantiomères répondent à la formule (I\*), ci-après :




dans laquelle :

Ar, Ar', Z, X, X', Y, Q, R, T et m sont tels que définis précédemment et "\*" signifie que l'atome de carbone ainsi marqué a une configuration absolue (+) ou (-) déterminée.


Ce procédé est caractérisé en ce que on traite un composé de formule :



dans un solvant tel que par exemple le dioxanne, en milieu acide, par exemple en présence d'acide chlorhydrique pour fournir l'acide de formule :




qui est estérifié dans un alcool AlkOH, où Alk est un alkyle de 1 à 4 atomes de carbone, en milieu acide, puis on traite l'ester correspondant de formule :




dans lequel Alk, Q, Ar', R\* et m sont tels que définis ci-dessus,

- soit avec un dérivé fonctionnel d'un acide de formule :




- soit avec un iso(thio)cyanate de formule :




Z et W étant tels que définis ci-dessus,

selon les conditions opératoires identiques à celles utilisées pour la préparation des dérivés (IV) ci-dessus, pour obtenir l'ester de formule :






qui est alors réduit en alcool correspondant de formule :



Ces alcools (V<sup>\*</sup>) correspondent aux composés de formule (V') ci-dessus, dans laquelle m, Q, T, Ar' et Z sont tels que définis précédemment, G est l'hydrogène et R<sup>°</sup> est R<sup>\*</sup>, ce dernier ayant la signification précédemment définie, lesdits composés étant sous forme optiquement pure. Ces composés sont nouveaux et font partie de l'invention.

L'alcool (V<sup>\*</sup>) est transformé en dérivé méthanesulfonate de formule:



selon les conditions opératoires identiques à celles utilisées pour la préparation des dérivés (VI) ci-dessus.


Les dérivés (VI<sup>\*</sup>) correspondent aux composés de formule (V') ci-dessus dans laquelle m, Q, T, Ar' et Z sont tels que définis précédemment, G est le méthanesulfonyle et R<sup>°</sup> est R<sup>\*</sup>, ce dernier ayant la signification précédemment définie, lesdits composés étant sous forme optiquement pure. Ces composés sont nouveaux et font partie de l'invention.


La substitution du mésylate (VI<sup>\*</sup>) par une amine de formule :



selon les conditions décrites pour l'obtention de (I) ci-dessus permet la préparation des dérivés (I'), après déprotection éventuelle, lesquels sont ensuite éventuellement transformés en l'un de leurs sels selon les méthodes classiques de salification.

Les composés de formule (XVII<sup>\*</sup>) sont connus ou peuvent être aisément préparés selon la méthode décrite par G. HELMCHEN et al. Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1979, 1, 18, 65 ; selon le schéma suivant :

SCHEMA 3



Les produits de formule (I\*) ainsi obtenus sont isolés, sous forme de base libre ou de sel, selon les techniques conventionnelles.


35 Lorsque le composé de formule (I\*) est obtenu sous forme de base libre, la salification est effectuée par traitement avec l'acide choisi dans un solvant organique. Par traitement de la base libre, dissoute par exemple dans un alcool tel que l'isopropanol, avec une solution de l'acide choisi dans le même solvant, on obtient le sel correspondant qui est isolé selon les techniques conventionnelles. Ainsi, on prépare par exemple le chlorhydrate, le bromhydrate, le sulfate, l'hydrogénosulfate, le dihydrogénophosphate, le

40 méthanesulfonate, le méthylsulfate, l'oxalate, le maléate, le fumarate, le naphthalène-2 sulfonate.

A la fin de la réaction, les composés de formule (I\*) peuvent être isolés sous forme d'un de leurs sels, par exemple le chlorhydrate ou l'oxalate ; dans ce cas, s'il est nécessaire la base libre peut être préparée par neutralisation dudit sel avec une base minérale ou organique.

Les composés selon l'invention ont fait l'objet d'essais biochimiques et pharmacologiques.

45 Les composés (I), (I\*) et les composés (XVI), où



et leurs sels ont montré des propriétés antagonistes de la liaison de la substance P dans des essais réalisés sur des membranes de cortex de rat et de cellules lymphoblastiques IM9, selon M.A. CASCIERI et

55 al., J. Biol. Chem., 1983, 258, 5158-5164 et D.D. PAYA et al., J. Immunol., 1984, 133, 3260-3265.

Les mêmes composés et leurs sels ont montré des propriétés antagonistes de la liaison de la NKA dans des essais réalisés sur des membranes de duodénum de rat, selon L. BERGSTOM et al., Mol. Pharmacol., 1987, 32, 764-771.

Les mêmes composés et leurs sels ont montré des propriétés antagonistes d'agonistes spécifiques des récepteurs NK<sub>1</sub>, NK<sub>2</sub>, NK<sub>3</sub> dans des essais réalisés sur différents organes isolés, selon D. REGOLL et al., Trends Pharmacol. Sci., 1988, 9, 290-295.

Les mêmes composés et leurs sels ont montré des propriétés globales antagonistes NK<sub>1</sub>, NK<sub>2</sub>, NK<sub>3</sub> dans des essais réalisés sur différents organes isolés, selon D. REGOLI et al., Trends Pharmacol. Sci., 1988, 9, 290-295 et Pharmacology, 1989, 38, 1-15.

Les mêmes composés et leurs sels ont montré des propriétés antagonistes de l'hypermotilité induite chez le rat par la substance P dans des essais pharmacologiques réalisés selon Elliot et al., Brain Res., 1986, 381, 68-76.

Les propriétés antagonistes de la salivation induite chez le rat par la substance P ou un agoniste spécifique NK<sub>1</sub> ([Sar<sup>9</sup> Met (02)<sup>11</sup>] SP) ont été mises en évidence par des essais pharmacologiques réalisés selon TAKEDA Y. and KRAUSE J.E., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1989, 86, 392-396.

Les propriétés analgésiques ont été mises en évidence par des essais pharmacologiques réalisés chez le rat arthritique selon V. KAYSER et al.; Proceedings of the Vth World Congress on Pain, DUMMER R., 15 GEBHART G.F. and BOND M.R. ed., Elsevier Biomedical Division, 1988, 72-79.

Les composés de la présente invention sont peu toxiques ; notamment, leur toxicité aiguë est compatible avec leur utilisation comme médicament. Pour une telle utilisation, on administre aux mammifères une quantité efficace d'un composé de formule (I), (I'), (XVI) ou d'un de leurs sels pharmaceutiquement acceptables.

Les composés de la présente invention sont généralement administrés en unité de dosage. Lesdites unités de dosage sont de préférence formulées dans des compositions pharmaceutiques dans lesquelles le principe actif est mélangé avec un excipient pharmaceutique.

Ainsi, selon un autre de ses aspects, la présente invention concerne des compositions pharmaceutiques renfermant, en tant que principe actif, un composé de formule (I), (I') ou de formule (XVI) ou un de leurs sels pharmaceutiquement acceptables.

Les composés de formule (I), (I') ou (XVI) ci-dessus et leurs sels pharmaceutiquement acceptables peuvent être utilisés à des doses journalières de 0,01 à 100 mg par kilo de poids corporel du mammifère à traiter, de préférence à des doses journalières de 0,1 à 50 mg/kg. Chez l'être humain, la dose peut varier de préférence de 0,5 à 4000 mg par jour, plus particulièrement de 2,5 à 1000 mg selon l'âge du sujet à 30 traiter ou le type de traitement : prophylactique ou curatif.

Dans les compositions pharmaceutiques de la présente invention pour l'administration orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, transdermique, locale ou rectale, les principes actifs peuvent être administrés sous formes unitaires d'administration, en mélange avec des supports pharmaceutiques classiques, aux animaux et aux êtres humains. Les formes unitaires d'administration appropriées 35 comprennent les formes par voie orale telles que les comprimés, les gélules, les poudres, les granules et les solutions ou suspensions orales, les formes d'administration sublinguale et buccale, les formes d'administration sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intranasale ou intraoculaire et les formes d'administration rectale.

Lorsque l'on prépare une composition solide sous forme de comprimés, on mélange le principe actif principal avec un véhicule pharmaceutique tel que la gélatine, l'amidon, le lactose, le stéarate de magnésium, le talc, la gomme arabique ou analogues. On peut enrober les comprimés de saccharose ou d'autres matières appropriées ou encore on peut les traiter de telle sorte qu'ils aient une activité prolongée ou retardée et qu'ils libèrent d'une façon continue une quantité prédéterminée de principe actif.

On obtient une préparation en gélules en mélangeant le principe actif avec un diluant et en versant le 45 mélange obtenu dans des gélules molles ou dures.

Une préparation sous forme de sirop ou d'elixir peut contenir le principe actif conjointement avec un édulcorant, acalorique de préférence, du méthylparaben et du propylparaben comme antiseptique, ainsi qu'un agent donnant du goût et un colorant approprié.

Les poudres ou les granules dispersibles dans l'eau peuvent contenir le principe actif en mélange avec 50 des agents de dispersion ou des agents mouillants, ou des agents de mise en suspension, comme la polyvinylpyrrolidone, de même qu'avec des édulcorants ou des correcteurs du goût.

Pour une administration rectale, on recourt à des suppositoires qui sont préparés avec de liants fondant à la température rectale, par exemple du beurre de cacao ou des polyéthylèneglycols.

Pour une administration parentérale, intranasale ou intraoculaire, on utilise des suspensions aqueuses, 55 des solutions salines isotoniques ou des solutions stériles et injectables qui contiennent des agents de dispersion et/ou des agents mouillants pharmacologiquement compatibles, par exemple le propylèneglycol ou le butylèneglycol.

Le principe actif peut être formulé également sous forme de microcapsules, éventuellement avec un ou


plusieurs supports ou additifs.

Les exemples suivants illustrent l'invention sans toutefois la limiter.


# 5 EXEMPLE 1

Chlorhydrate de N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl] -dichloro-2,4 benzamide. SR 45672 A

10



20



25

A) Dichlorhydrate d'amino-1 (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butane.

14,5 g de chlorhydrate de (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyronitrile sont mis en solution dans 400 ml d'éthanol 95°. Une solution de 20 ml d'ammoniaque concentré dans 40 ml d'eau et de nickel de Raney (10 % en poids de la quantité d'amine) sont ajoutés au mélange qui est ensuite placé sous atmosphère d'hydrogène sous forte agitation pendant 4 heures, temps au bout duquel 1,67 l d'hydrogène sont consommés. Après filtration du catalyseur, on concentre le filtrat sous vide, reprend le résidu dans l'acétate d'éthyle, lave à l'eau, sèche et concentre sous vide. Le résidu est repris dans une solution chlorhydrique dans le méthanol, filtré et recristallisé dans un mélange acétone/éther : 3/7.

35  $m = 10,2 \text{ g}$

$F = 210^\circ \text{C}$ .

B) SR 45672 A

40

2,3 g du produit obtenu précédemment et 1 g de chlorure de l'acide dichloro-2,4 benzoïque sont mis en solution dans 100 ml de dichlorométhane en présence de 0,03 g de triéthylamine. Le mélange réactionnel est agité pendant 4 heures à température ambiante puis concentré sous vide, repris dans l'eau, extrait à l'éther, séché sur  $\text{MgSO}_4$  et concentré sous vide. Le résidu est chromatographié sur gel de silice, éluant : dichlorométhane/méthanol: 97/3. La concentration des fractions pures fournit un résidu qui est repris dans l'éther chlorhydrique.

45

$m = 1 \text{ g}$



$F = 86-87^\circ \text{C}$ .

50

# EXEMPLE 2

Chlorhydrate de N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-5 (dichloro-3,4 phényl)-2 pentyl]-dichloro-2,4 benzamide . SR



55 45083 A



En procédant comme dans l'exemple 1 mais en utilisant comme produit de départ la (benzyl-4  
 15 pipéridinyl-1)-5 (dichloro-3,4 phényl)-2 pentynitrile on obtient le SR 45083 A, recristallisé dans un mélange  
 dichlorométhane, pentane.  
 $F = 98-100^\circ \text{C}$ .

### 20 EXEMPLE 3

Chlorhydrate hémihydrate de N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (difluoro-3,4 phényl)-2 butyl]-diméthyl-2,4 benza-  
 mide. SR 46316 A



40 1,2 g de BOP sont ajoutés à une solution de 1 g d'acido-1 (benzyl-4 pipéridinyl-1)-3 (difluoro-3,4  
 phényl)-2 butane, 0,34 g d'acide diméthyl-2,4 benzoïque et 1 g de triéthylamine dans 50 ml de dichloromé-  
 thane. Le mélange réactionnel est agité pendant une heure à température ambiante et concentré sous vide.  
 Le résidu est repris dans l'eau, extrait à l'éther, lavé à l'eau puis avec une solution de bicarbonate de  
 sodium, séché sur  $\text{MgSO}_4$  puis concentré sous vide. Le résidu est repris dans le chlorure de méthylène  
 45 dans lequel on prépare le chlorhydrate qui est filtré et lavé à l'éther.


$m = 0,4 \text{ g}$

$F = 99-103^\circ \text{C}$ .

Les composés décrits dans les tableaux 1 et 2 ont été préparés selon les exemples 1, 2 ou 3.

Dans la formule ci-dessous, le groupe Z indiqué dans la formule I est un groupe phényle non substitué,  
 50 mono, di- ou trisubstitué par A, A', A''.

TABLEAU 1



15







Produit SR	Ar'	A	A'	A''	F, °C	Solvant de
(Exemple n°)					recrist.	Sel
20	47807 A (4)		H	H	H	116 éther isopropylique HCl
25	46679 A (5)		2-F	H	H	100 - 102 pentane/éther HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
30	46101 A (6)		2-F	4-F	H	81 - 84 CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
35	46099 A (7)		2-F	4-F	H	78 - 80 CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O

40

45

50







55

	:	:	:	:	:	:	:
5	:	45966 A		: 2-F	: 4-F	: H	: 83 - 86
	:	(8)		:	:	:	: éther isopropylique
	:			:	:	:	: HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
10	:			:	:	:	:
	:	46032 A		: 2-Cl	: H	: H	: 186
15	:	(9)		:	:	:	: éther
	:			:	:	:	: HCl
	:			:	:	:	:
20	:	47704 A		: 3-Cl	: H	: H	: 158-160
	:	(10)		:	:	:	: AcOEt
25	:			:	:	:	: HCl
	:			:	:	:	:
	:	46454 A		: 4-Cl	: H	: H	: 112 - 114
30	:	(11)		:	:	:	: CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther
	:			:	:	:	: HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
35	:			:	:	:	:
	:	47462 A		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 95
40	:	(12)		:	:	:	: éther
	:			:	:	:	: HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
	:			:	:	:	:
45	:	47801 A		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 108
	:	(13)		:	:	:	: éther
	:			:	:	:	: HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O

50






55



	:	:	:	:	:	:	:
5	:	46100 A		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 95 - 97
	:	(14)		:	:	:	: CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther
	:		F	:	:	:	: HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
10	:			:	:	:	:
	:	46238 A		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 96 - 101
15	:	(15)		:	:	:	: éther isopropylique
	:		F	:	:	:	: HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
	:			:	:	:	:
20	:	45910 A		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 83 - 85
	:	(16)		:	:	:	: CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther
25	:		Cl	:	:	:	: HCl
	:			:	:	:	:
	:	46152 A		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 94
30	:	(17)		:	:	:	: pentane/éther
	:		Cl	:	:	:	: HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
	:			:	:	:	:
35	:	46011 A		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 107 - 110
	:	(18)		:	:	:	: éther
	:		Cl	:	:	:	: HCl
40	:			:	:	:	:
	:	45672 B		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 88 - 90
45	:	(19a)		:	:	:	: pentane
	:		Cl	:	:	:	: méthanesulfonate
	:			:	:	:	: hydrate

50







55







	:	:	:	:	:	:	:
5	:	:	:	:	:	:	:
	:	45672 C		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 70 - 72
	:	(19b)		:	:	:	: pentane
	:			:	:	:	: glycolate
10	:			:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:
	:	45672 D		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 144 - 146
	:	(19c)		:	:	:	: pentane
15	:			:	:	:	: gluconate
	:			:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:
20	:	:	:	:	:	:	:
	:	45672 E		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 103 - 105
	:	(19d)		:	:	:	: pentane
	:			:	:	:	: citrate
25	:			:	:	:	: hémihydrate
	:			:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:
	:	45672 F		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 86 - 90
30	:	(19e)		:	:	:	: pentane
	:			:	:	:	: iséthionate
	:			:	:	:	: hémihydrate
35	:			:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:
	:	45672 H		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 136-138
	:	(19f)		:	:	:	: méthanol
40	:			:	:	:	: base libre
	:			:	:	:	:

45

50

55


	:	:		:	:	:	:	:	:
	:	46153 A	:	2-Cl	4-Cl	H	:	104-106	:
5	:	(20)	:	:	:	:	:	pentane/éther	:
	:	:	:	:	:	:	:	HCl	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:
10	:	46183 A	:	2-Cl	4-Cl	H	:	117 - 121	:
	:	(21)	:	:	:	:	:	éther	:
	:	:		:	:	:	:	HCl	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:
15	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	46364 A	:	2-Cl	4-Cl	H	:	92	:
	:	(22)	:	:	:	:	:	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther	:
20	:	:		:	:	:	:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:
25	:	47158 A	:	2-Cl	4-Cl	H	:	96-98	:
	:	(23)	:	:	:	:	:	pentane/éther	:
	:	:		:	:	:	:	HCl	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:
30	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	47225 A	:	2-Cl	4-Cl	H	:	92	:
	:	(24)	:	:	:	:	:	pentane/éther	:
35	:	:		:	:	:	:	HCl	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	46498 A	:	2-Cl	4-Cl	H	:	112-114	:
40	:	(25)	:	:	:	:	:	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther	:
	:	:		:	:	:	:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:

	:	:	:	:	:	:	:
5	:	45261 A		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 90-94
	:	(26)	:	:	:	:	: isopropanol
	:	:	:	:	:	:	: méthanesulfonate
	:	:	:	:	:	:	:
10	:	45870 A		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 112-114
	:	(27)	:	:	:	:	: pentane
	:	:	:	:	:	:	: HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
	:	:	:	:	:	:	:
15	:	46362 A		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 102
	:	(28)	:	:	:	:	: pentane
	:	:	:	:	:	:	: HCl
	:	:	:	:	:	:	:
20	:	47743 A		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 115-118
	:	(29)	:	:	:	:	: AcOEt
	:	:	:	:	:	:	: HCl
25	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:
30	:	46844 A		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 126-128
	:	(30)	:	:	:	:	: éther
	:	:	:	:	:	:	: HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
	:	:	:	:	:	:	:
35	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:
40	:	46360 A		: 2-Cl	: 4-Cl	: H	: 138-144
	:	(31)	:	:	:	:	: CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther
	:	:	:	:	:	:	: HCl

45







50

55

	:	:		:	:	:	:	:
5	:	46206 A	:	3-Cl	5-Cl	H	108	:
	:	(32)	:	:	:	:	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther	:
	:	:	:	:	:	:	108	:
	:	:	:	:	:	:	:	:
10	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	46236 A	:	3-Cl	5-Cl	H	90	:
	:	(33)	:	:	:	:	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther	:
15	:	:	:	:	:	:	HCl	:
	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	46501 A	:	2-Cl	6-Cl	H	128-130	:
20	:	(34)	:	:	:	:	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther	:
	:	:	:	:	:	:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:
	:	:	:	:	:	:	:	:
25	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	46499 A	:	2-Cl	4-I	H	112-114	:
	:	(35)	:	:	:	:	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther	:
30	:	:	:	:	:	:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:
	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	45871 A	:	2-Cl	4-OH	H	142-144	:
35	:	(36)	:	:	:	:	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther	:
	:	:	:	:	:	:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:
	:	:	:	:	:	:	:	:
40	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	46815 A	:	2-Cl	4-CH <sub>3</sub>	H	92	:
	:	(37)	:	:	:	:	hexane	:
45	:	:	:	:	:	:	HCl	:
	:	:	:	:	:	:	:	:








50

55

	:	:	:	:	:	:	:
5	:	47146 A		: 2-Cl	: 4-NO <sub>2</sub>	: H	: 160-164
	:	(38)		:	:	:	: AcOEt
	:			:	:	:	: HCl
10	:			:	:	:	:
	:	46221 A		: 4-OH	: H	: H	: 134
	:	(39)		:	:	:	: éther
15	:			:	:	:	: HCl
	:			:	:	:	:
20	:	46315 A		: 2-OH	: 4-OH	: H	: 136-141
	:	(40)		:	:	:	: CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther
	:			:	:	:	: HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
25	:			:	:	:	:
	:	45911 A		: 3-CF <sub>3</sub>	: H	: H	: 86-89
30	:	(41)		:	:	:	: éther
	:			:	:	:	: HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
	:			:	:	:	:
35	:	46561 A		: 2-OCH <sub>3</sub> :	: 4-OCH <sub>3</sub> :	: H	: 104
	:	(42)		:	:	:	: CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther
	:			:	:	:	: HCl
40	:			:	:	:	:
	:	45912 A		: 3-OCH <sub>3</sub> :	: 4-OCH <sub>3</sub> :	:	: 86-89
45	:	(43)		:	:	:	: éther
	:			:	:	:	: HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O

50

55

	:	:	:	:	:	:	:
5	:	47800 A		:	3-NO <sub>2</sub> : 4-F	:	H : 119
	:	(44)		:	:	:	: AcOEt
	:			:	:	:	: HCl
10	:			:	:	:	:
	:	46828 A		:	2-NO <sub>2</sub> : 4-NO <sub>2</sub>	:	H : 112-120
	:	(45)		:	:	:	: éther isopropylique
15	:			:	:	:	: HCl
	:			:	:	:	:
20	:	46758 A		:	3-NO <sub>2</sub> : 5-NO <sub>2</sub>	:	H : 194-198
	:	(46)		:	:	:	: éther
	:			:	:	:	: HCl
25	:			:	:	:	:
	:	46184 A		:	3-NO <sub>2</sub> : 5-NO <sub>2</sub>	:	H : 115-120
30	:	(47)		:	:	:	: éther
	:			:	:	:	: HCl
	:			:	:	:	:
35	:	46526 A		:	2-CH <sub>3</sub> : 4-CH <sub>3</sub> : 6-CH <sub>3</sub>	:	: 128-130
	:	(48)		:	:	:	: CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther
	:			:	:	:	: HCl
40	:			:	:	:	:
	:	46888 A		:	2- 	:	H : 175
45	:	(49)		:	:	:	: éther
	:			:	:	:	: HCl
	:			:	:	:	:

50

55














5	46209 A (50)			H	H	195 éther HCl
10	46560 A (51)			H	H	132 CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther HCl
15						
20	46317 A (52)			H	H	95-100 CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
25						
30	46672 A (53)			H	H	134 éther HCl
35						
40	46391 A (54)			H	H	207 acétate d'éthyle 2HCl
45						
50	46390 A (55)			H	H	158 acétate d'éthyle 2HCl
55						



TABLEAU 2









	:	Produit SR	:	m	:	Z	:	F, °C	Solvant recrist.
	:	(Exemple n°)	:		:		:	Sel	
20	:		:		:		:		
	:		:		:		:	-	
	:	45303 A	:	2	:	H	:	éther	
25	:	(56)	:		:		:	HCl	
	:		:		:		:		
	:		:		:		:	77	
	:	47122 A	:	2	:	-CH <sub>3</sub>	:	éther	
30	:	(57)	:		:		:	HCl	
	:		:		:		:		
	:		:		:		:	170	
	:	45599 A	:	2	:	-CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	:	éther	
35	:	(58)	:		:		:	HCl	
	:		:		:		:		
	:		:		:		:	170	
40	:	47315 A	:	2	:	-CH-(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	:	éther	
	:	(59)	:		:		:	HCl	
	:		:		:		:		
	:		:		:		:	150	
45	:	47581 A	:	3	:	-CH-(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	:	éther isopropylique	
	:	(60)	:		:		:	HCl	
	:		:		:		:		








50

55

	:	:	:	:	160	:
	:	47314 A	: 2	: -C-(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	: éther	:
5	:	(61)	:	:	: HCl	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	: 188	:
	:	45946 A	: 2	: -CH <sub>2</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	: éther	:
10	:	(62)	:	:	: HCl	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	: 82-84	:
	:	47144 A	: 1	:	: éther	:
15	:	(63)	:	:	: HCl	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	: 160	:
	:	45305 A	: 2	:	: éther	:
20	:	(64)	:	:	: HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	: 122	:
	:	47242 A	: 3	:	: éther	:
25	:	(65)	:	:	: HCl	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	: 104	:
	:	47989 A	: 3	:	: éther isopropylique	:
30	:	(66)	:	:	: HCl	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	: 166	:
	:	45947 A	: 2	:	: éther	:
	:	(67)	:	:	: 2HCl	:
35	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	: 170	:
	:	47721 A	: 3	:	: AcOEt	:
40	:	(68)	:	:	: HCl	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
45	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
50	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
55	:	:	:	:	:	:

	:	:	:	:	:	:			
	:	47720 A	:	3	:		:	185	:
	:	(69)	:	:	:		:	AcOEt	:
5	:		:	:	:		:	HCl	:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
10	:	47909 A	:	2	:		:	104	:
	:	(70)	:	:	:		:	éther	:
	:		:	:	:		:	HCl	:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
15	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
	:	48043 A	:	3	:		:	92	:
	:	(71)	:	:	:		:	éther isopropylique	:
	:		:	:	:		:	HCl	:
20	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
25	:	46695 A	:	2	:		:	100 (décomposition)	:
	:	(72)	:	:	:		:	éther	:
	:		:	:	:		:	HCl	:
	:		:	:	:		:		:
30	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
35	:	46212 A	:	2	:		:	218	:
	:	(73)	:	:	:		:	éther	:
	:		:	:	:		:	HCl	:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
40	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
	:	46341 A	:	2	:		:	224	:
	:	(74)	:	:	:		:	acétone	:
	:		:	:	:		:	HCl	:
45	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
50	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
	:		:	:	:		:		:
55	:		:	:	:		:		:

	:	:	:	:	:	:
5	:	46669 A	:	2	:	:
	:	(75)	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
10	:	:	:	:	:	:
	:	46673 A	:	2	:	:
	:	(76)	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
15	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	45880 A	:	2	:	:
20	:	(77)	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
25	:	45841 A	:	2	:	:
	:	(78)	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
30	:	45792 A	:	2	:	:
	:	(79)	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
35	:	45869 A	:	2	:	:
	:	(80)	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
40	:	:	:	:	:	:
	:	46215 A	:	2	:	:
45	:	(81)	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:



: 210

: acétone

: HCl

: 158

: acétate d'éthyle

: 2HCl

: 114-116

: éther

: HCl

: 146

: éther

: HCl

: 110

: éther

: HCl

: 90-92

: CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/éther

: HCl

: 145


: éther

: HCl

5	:	:	:	-CH <sub>2</sub>	:	125
	:	46213 A	:	2	:	éther
	:	(82)	:	:	:	HCl
	:		:	:	:	
	:		:	:	:	
	:		:	:	:	174
10	:	46028 A	:	2	:	éther
	:	(83)	:	:	:	2HCl
	:		:	:	:	
	:		:	:	:	
15	:		:	:	:	128
	:	46389 A	:	2	:	acétate d'éthyle
	:	(84)	:	:	:	2HCl
	:		:	:	:	
20	:		:	:	:	
	:		:	:	:	168
	:	46294 A	:	2	:	éther
25	:	(85)	:	:	:	2HCl
	:		:	:	:	
	:		:	:	:	
	:		:	:	:	130
30	:	45793 A	:	3	:	éther
	:	(86)	:	:	:	HCl

### EXAMPLE 87

40 Chlorhydrate de N'[(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl] N-naphtyl-1 urée. SR 45924 A.



2,52 g d'amino-1 (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butane sont mis en solution dans 30 ml de benzène anhydre puis on ajoute 1,09 g de naphthyl-1 isocyanate et laisse le mélange réactionnel sous agitation pendant une nuit à température ambiante. L'excès d'isocyanate est décomposé par addition de 10


ml de méthanol et chauffage du mélange à ébullition pendant 30 minutes.









Le mélange est concentré sous vide et le résidu est repris dans un mélange acétate d'éthyle-eau, lavé avec une solution de soude à 10 % puis à l'eau, décanté, séché sur  $\text{MgSO}_4$  et concentré sous vide. Le résidu est repris dans l'acétone puis on ajoute de l'éther chlorhydrique, filtre le chlorhydrate et le concrétise dans l'éther.











$$m = 3,3 \text{ g}$$
$$Y = 174^{\circ}\text{C}$$








Les composés décrits dans le tableau 3 ont été préparés selon l'exemple 87.



### TABLEAU 3



20	Produit n° SR	m	Ar'	Z	W	F, °C	Solv. recryst.
	(Exemple n°)					Sel	
25	45924 B (87b)	2			0	158	éther méthanesulfonate hémihydrate
30							
35	45924 C (87c)	2			0	138	éther glycolate
40							
45	45924 D (87d)	2			0	124	acétate d'éthyle gluconate
50							
55	45924 E (87e)	2			0	148	hexane trifluoroacétate

5	45924 F (87f)	2			138 0 : éther iséthionate
10	45923 A (88)	2			182 0 : éther HCl
15	45308 A (89)	2			120 0 : éther HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O
20	45673 A (90)	2			105-107 0 : éther/isopropanol HCl, H <sub>2</sub> O
25	45671 A (91)	2			96-98 S : hexane méthanesulfonate
30					
35					
40					

5	:	:	:		:		:	:	178
	:	46670 A	:	2	:		:	S	éther
	:	(92)	:	:	:		:	:	HCl
	:		:	:	:		:	:	
	:		:	:	:		:	:	
10	:	:	:	:	:		:	:	
	:	45903 A	:	3	:		:	CH <sub>2</sub>	135
	:	(93)	:	:	:		:		0 : éther
	:		:	:	:		:		HCl
	:		:	:	:		:		
15	:		:	:	:		:		
	:		:	:	:		:		
	:		:	:	:		:		
	:		:	:	:		:		
20	:	46987 A	:	2	:		:		0 : 225
	:	(94)	:	:	:		:		éther
	:		:	:	:		:		chlorhydrate
	:		:	:	:		:		
	:		:	:	:		:		
25	:		:	:	:		:		
	:		:	:	:		:		
	:	46986 A	:	2	:		:		0 : 215
	:	(95)	:	:	:		:		éther
30	:		:	:	:		:		chlorhydrate
	:		:	:	:		:		



2,26 g de chlorhydrate d' amino-1 (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butane et 0,89 g de chloroformate de benzyle sont mis en solution dans 30 ml de dichlorométhane. Le mélange est refroidi à 0 °C puis on ajoute 1,52 g de triéthylamine en solution dans 10 ml de dichlorométhane. Le mélange réactionnel est laissé 1 heure à température ambiante puis concentré sous vide. Le résidu est repris dans l'eau, extrait à l'acétate d'éthyle, lavé avec une solution de soude à 10 % puis avec une solution saturée de chlorure de sodium, séché sur MgSO<sub>4</sub> et concentré sous vide. Le résidu est chromatographié sur gel de silice, éluant : dichlorométhane/méthanol : 96/4. Après concentration sous vide des fractions pures, le résidu est repris dans l'éther, on ajoute de l'éther chlorhydrique et filtre le chlorhydrate.


$m = 1,7 \text{ g}$   
 $F = 130^\circ \text{C}$




## EXEMPLE 97

Chlorhydrate de N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl] carbamate d'éthyle.

5



10



15

9,8 g de dichlorhydrate d' amino-1 (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butane et 6,7 g de triéthylamine sont mis en solution dans 200 ml de dichlorométhane. On additionne à cette solution, goutte à goutte et à température ambiante, 2,28 g de chloroformiate d'éthyle et abandonne le mélange réactionnel pendant une heure à température ambiante, sous agitation. Le mélange réactionnel est concentré sous vide. le résidu est repris dans l'acétate d'éthyle/eau et lavé successivement avec une solution de soude à 5 %, à l'eau et avec une solution saturée de chlorure de sodium. La phase organique est séchée sur  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  et concentré sous vide pour fournir un résidu qui est chromatographié sur gel de silice, éluant dichlorométhane/méthanol : 94/6. La concentration des fractions pures donne un résidu qui est repris dans l'acétate d'éthyle. On ajoute de l'éther chlorhydrique à la solution et filtre le chlorhydrate.

25

$m = 6,5 \text{ g}$

$F = 108-110^\circ \text{C}$


30

## EXEMPLE 98


35

Chlorhydrate de N-méthyl-N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl] dichloro-2,4 benzamide. SR 46650 A.

40



45



50

a) Chlorhydrate de (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 N-méthylamino-1 butane.

55

6,5 g du produit obtenu dans l'exemple 97 et 1,6 g d'hydruure de lithium aluminium sont mis en solution dans 150 ml de tétrahydrofurane et chauffés à reflux pendant 3 heures. Le mélange réactionnel est hydrolysé par addition d'une solution de soude 2 N puis filtré sur célite. Le filtrat est concentré sous vide, le

résidu est repris dans l'acétate d'éthyle et l'addition d'éther chlorhydrique permet l'obtention du chlorhydrate.

$m = 4,3 \text{ g}$   
 $F = 234-236^{\circ} \text{ C}$




5

b) SR 46650 A.

En faisant réagir le chlorure de l'acide dichloro-2,4 benzoïque sur le produit obtenu précédemment  
10 selon le mode opératoire décrit dans l'exemple 1 on obtient le SR 46650 A.  
F = 140-142° C

### EXAMPLE 99

Dichlorhydrate hémihydrate de N-(amino-1 hexyl) N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl] dichloro-2,4 benzamide. SR 46510 A.



a) (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 N(tritylaminopentylamido)-1 butane.

3 g de chlorhydrate d'amino-1 (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butane sont mis en suspension dans 60 ml de chlorure de méthylène en présence de 3,2 ml de triéthylamine. Après dissolution de la diamine, on ajoute 2,5 g d'acide tritylaminocaproïque puis 3,2 g de BOP. Le mélange réactionnel est agité à température ambiante pendant 30 minutes, lavé à l'eau, avec une solution de soude diluée puis à l'eau, décanté, séché sur  $MgSO_4$ , filtré et concentré sous vide. Le résidu est chromatographié sur gel de silice, éluant : chlorure de méthylène/méthanol : 95/5. La concentration des fractions pures permet l'obtention de 3,6 g du produit attendu.

b) (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 N(tritylamino-1 hexylamino)-1 butane.

55 3,6 g du produit obtenu précédemment sont mis en solution dans 40 ml de tétrahydrofurane et additionnés goutte à goutte à une suspension de 600 mg d'hydrure de lithium aluminium dans 20 ml de tétrahydrofurane. Le mélange réactionnel est chauffé à reflux pendant 18 heures puis refroidi, hydrolysé, filtré et concentré sous vide. Le résidu est chromatographié sur gel de silice, éluant chlorure de

méthylène/méthanol 80/20. La concentration des fractions pures fournit 1,9 g du produit attendu.

5 c) N[(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 N(tritylamino-1 hexylamino)-butyl]dichloro-2,4 benza-  
mide.

10 1,9 g du produit obtenu précédemment sont mis en solution dans 30 ml de chlorure de méthylène. La solution est refroidie à  $-20^{\circ}\text{C}$  puis on ajoute 0,57 g de chlorure de dichloro-2,4 benzoyle dans 10 ml de chlorure de méthylène. On laisse revenir le mélange à température ambiante, le lave deux fois à l'eau, décante, sèche sur  $\text{MgSO}_4$  et concentre sous vide. Le résidu est chromatographié sur gel de silice, éluant : chlorure de méthylène/méthanol : 95/5. La concentration des fractions pures fournit 1,5 g de l'amide attendue.

15 d) SR 46510 A

1,5 g du dérivé tritylé obtenu précédemment sont mis en solution dans 15 ml d'acide formique à 50 % dans l'eau et agités à  $60^{\circ}\text{C}$  pendant une heure. Le mélange refroidi est filtré et le filtrat est concentré sous vide. Le résidu est repris dans l'eau, lavé à l'éther, alcalinisé avec de la soude, extrait au chlorure de méthylène, décanté, séché sur  $\text{MgSO}_4$  et concentré sous vide. Le résidu obtenu est repris dans 5 ml de chlorure de méthylène et on ajoute de l'éther chlorhydrique jusqu'à  $\text{pH} = 1$ .

m = 1g

F =  $100^{\circ}\text{C}$  (décomposition).

25

30

35


40

45

50

55

TABLEAU 4






15	:	:	:	:	:	:	Analyse élémentaire	:
	:	n° SR	:	:	:	:	C H N	:
	:	exemple n°	:	m	:	B : B' : Z	Calculé %	:
	:	:	:	:	:	:	Trouvé %	:
20	:	:	:	:	:	:	ou F°C et Sel	:
	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	60,70 6,37 5,05	:
25	:	47827 A	:	2	:	3-Cl : 4-Cl :	60,73 6,75 4,93	:
	:	(100)	:	:	:	:	HCl, H <sub>2</sub> O	:
	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:
30	:	47852 A	:	2	:	H : 3-F :	88	:
	:	(101)	:	:	:	:	HCl	:
	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	59,94 6,10 4,99	:
35	:	47239 A	:	2	:	3-Cl : 4-Cl :	59,84 6,10 4,85	:
	:	(102)	:	:	:	:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:
	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	59,94 6,10 4,99	:
40	:	47829 A	:	2	:	3-Cl : 4-Cl :	59,83 6,30 4,77	:
	:	(103)	:	:	:	:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:

45

50


55

	:	:	:	:	:	S	:	60,57	6,31	4,87	:				
	:	47241 A	:	3	:	3-Cl	:	4-Cl	:		:	60,88	6,47	4,74	:
	:	(104)	:	:	:	:	:	:	:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:				
5	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:				:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	64,92	6,54	5,04	:
	:	47828 A	:	2	:	3-Cl	:	4-Cl	:		:	64,59	6,77	4,88	:
	:	(105)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:		:
10	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:				:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:				:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:				:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	58,36	5,68	4,39	:
15	:	47240 A	:	3	:	3-Cl	:	4-Cl	:		:	58,46	5,65	4,68	:
	:	(106)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:		:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:				:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:				:
20	:	:	:	:	:	:	:	:	:	Cl	:				:


## EXEMPLE 107

Chlorhydrate de N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 isobutyl-2 butyl]-dichloro-2,4 benzamide. SR 46753 A.


30



35



40



45

50

a) (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 isobutyl-2 butyronitrile.

6 g de (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyronitrile sont mis en solution dans 70 ml d'éther anhydre en présence de 0,62 g d'amidure de sodium. Le mélange réactionnel est chauffé à reflux pendant 2 heures, puis on le laisse revenir à température ambiante et ajoute 2,12 g de bromo-1 méthyl-2 propane. Le mélange réactionnel est chauffé à reflux pendant 24 heures et concentré sous vide. Le résidu est repris dans l'eau, extrait à l'acétate d'éthyle, décanté, séché sur  $\text{MgSO}_4$ , filtré et concentré sous vide.

55

Le produit attendu est obtenu après une purification par chromatographie sur gel de silice, éluant : hexane/acétate d'éthyle : 90/10.

- 5 b) Amino-1 (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényle)-2 isobutyl-2 butane.

2,6 g du produit obtenu précédemment sont mis en solution dans un mélange de 30 ml d'ammoniaque et 20 ml d'eau. On ajoute une quantité catalytique de nickel de Raney et on hydrogène à pression atmosphérique à température ambiante. Le catalyseur est séparé par filtration et le filtrat est concentré sous vide. Le résidu est repris dans le méthanol et l'addition d'éther chlorhydrique permet l'obtention du chlorhydrate.

- 15 c) SR 46753 A.

En faisant réagir le produit obtenu précédemment avec le chlorure de l'acide dichloro-2,4 benzoïque comme décrit dans l'exemple 1 on obtient le SR 46753 A.

F = 126 °C

Les composés décrits dans le tableau 5 ont été synthétisés selon l'exemple 107.

- 20 Dans la formule ci-dessous, le groupe Ar' indiqué dans la formule I est un groupe dichloro-3,4 phényle et le groupe Z est un groupe dichloro-2,4 phényle.

25

30

35


40

45

50

55

TABLEAU 5



15	: Produit n° SR :	Q	: F, °C	Solvant recrist.	:
	: (Exemple n°) :		: Sel		:
20	:	:	:	:	:
	: 46507 A :		: 145-157	:	:
	: (108) :		: dichlorométhane/éther	:	:
	:		: 2HCl	:	:
25	:	:	:	:	:
	: 46754 A :		: 124	:	:
	: (109) :		: pentane/éther	:	:
	:		: 2HCl, H2O	:	:
30	:		:	:	:
	:		:	:	:
	:		:	:	:
35	:	:	: 135-144	:	:
	: 46566 A :		: dichlorométhane/éther	:	:
	: (110) :		: 2HCl, H2O	:	:



40

## EXEMPLE 111

45 Chlorhydrate de N [(benzoyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl]-dichloro-2,4 benzamide. SR 46159 A.

50

55



15 a) (Dichloro-3,4 phényl)-3 (tétrahydropyranyl-2)-1 nitrile-3 propane.

20 g d'hydru de sodium à 55-60 % dans l'huile sont mis en suspension dans 200 ml de tétrahydrofurane sec. On ajoute goutte à goutte à 20 °C, en 30 minutes, une solution de 85 g de dichloro-3,4 phényl acétonitrile dans 500 ml de tétrahydrofurane puis on agite le mélange réactionnel à température ambiante pendant 2 heures. Le mélange est refroidi à -20 °C et on ajoute une solution de 98 g de bromo-1 tétrahydropyranyl-2 éthane dans 100 ml de tétrahydrofurane, on laisse revenir le mélange à température ambiante et après 2 heures on ajoute une solution de 50 g de chlorure d'ammonium dans 3 litres d'eau. On extrait avec 1,5 litres d'éther, lave avec une solution saturée de chlorure de sodium, décante, sèche sur  $\text{MgSO}_4$  et concentre sous vide.

25 Le résidu est chromatographié sur gel de silice, éluant : dichlorométhane. Les fractions de produit pur sont concentrées sous vide pour fournir 83,6 g d'une huile.

30 b) Amino-1 (dichloro-3,4 phényl)-2 (tétrahydropyranyl-2)-4 butane.

83,6 g du nitrile obtenu précédemment sont mis en solution dans 100 ml d'éthanol absolu. On ajoute 350 ml d'ammoniaque concentré puis, sous balayage d'azote on ajoute du nickel de Raney (10 % de la quantité d'amine de départ. On hydrogène ensuite sous atmosphère d'hydrogène à température ambiante et pression ordinaire.

35 11,9 litres d'hydrogène sont absorbés en 3 heures. Le catalyseur est séparé par filtration sur célite, le filtrat est concentré sous vide, le résidu est repris dans une solution saturée de chlorure de sodium. Après extraction à l'éther et séchage sur  $\text{MgSO}_4$  on obtient 82,5 g d'une huile.

40 c) (Dichloro-2,4 benzoylamino)-1 (dichloro-3,4 phényl)-2 (tétrahydropyranyloxy-2)-4 butane.

80 g de l'amine obtenue précédemment sont mis en solution dans 800 ml de dichlorométhane. La solution est refroidie à 0 °C, on ajoute 38,4 ml de triéthylamine puis 55 g de chlorure de l'acide dichloro-2,4 benzoïque. Le mélange réactionnel est alors agité à température ambiante pendant une heure puis lavé à l'eau. La phase organique est décantée, séchée sur  $\text{MgSO}_4$  et concentrée sous vide pour fournir 120 g d'une huile.

50 d) (Dichloro-2,4 benzoylamino)-1 (dichloro-3,4 phényl)-2 butanol-4.

120 g du produit obtenu précédemment sont mis en solution dans 1 litre de méthanol en présence de 12 g d'acide paratoluènesulfonique. Le mélange réactionnel est agité pendant 18 heures à température ambiante puis concentré sous vide. Le résidu est repris dans le dichlorométhane et lavé avec une solution à 10 % de carbonate de sodium. La phase organique est décantée et séchée sur  $\text{MgSO}_4$  pour fournir 106 g d'une huile.

e) (Dichloro-2,4 benzoylamino)-1 (dichloro-3,4 phényl)-2 métyloxy-4 butane.



106 g de l'alcool obtenu précédemment sont mis en solution dans 1 l de dichlorométhane puis on ajoute à la solution refroidie à 0 °C 44 ml de triéthylamine et 24,2 ml de chlorure de mésyle. Le mélange réactionnel est agité à 0 °C pendant 45 minutes, lavé 3 fois à l'eau glacée, décanté, séché sur MgSO<sub>4</sub> et concentré sous vide.

- 5 Le résidu est recristallisé de l'éther isopropylique.  
m = 95 g

f) SR 46159 A.

10

3 g du mésylate obtenu précédemment et 3,1 g de benzoyl-4 pipéridine sont mis en solution dans 7 ml de dichlorométhane et le mélange réactionnel est chauffé à reflux pendant 24 heures. Le mélange est dilué en dichlorométhane, lavé à l'eau, puis avec une solution de soude diluée, puis encore à l'eau. La phase organique est décantée, séchée sur MgSO<sub>4</sub> et concentrée sous vide. Le résidu est chromatographié sur gel de silice, éluant : dichlorométhane/méthanol : 70/30.

15

Les fractions de produit pur sont concentrées sous vide, le résidu est dilué dans le dichlorométhane et l'addition d'éther chlorhydrique permet l'obtention du chlorhydrate.  
m = 930 mg

20

C H N	: Calculé %	55,83	4,84	4,49
C <sub>29</sub> H <sub>28</sub> Cl <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> .HCl.O,5H <sub>2</sub> O	: Trouvé %	55,69	4,97	4,71

25

Les composés des exemples répertoriés dans le tableau 6 (I, Ar' = dichloro-3,4 phényle ; Z = dichloro-2,4 phényle) ont été préparés selon l'exemple 111.

Les composés des exemples répertoriés dans le tableau 7 (I, Ar' = dichloro-3,4 phényle) et le tableau 8 (I, Ar' = dichloro-3,4 phényle ou trifluorométhyl-3 phényle) ont été préparés selon les exemples 1, 2 ou 3.

30

35


40

45

50

55

TABLEAU 6
















15	:	:		:	Analyse élémentaire			:
	:	Produit n° SR :	Ar - C(X)(X') - Y - N	:	C	H	N	:
	:	(Exemple n°) :		:	Calculé %			:
	:	:		:	Trouvé %			:
20	:	:		:	Sel			:
<hr/>								
	:	:		:	55,65	5,15	4,47	:
25	:	47440 A		:	55,71	5,25	4,30	:
	:	(112)		:	HCl			:
	:	:		:				:
	:	:		:				:
30	:	:		:				:
	:	46416 A		:	58,16	4,88	4,67	:
	:	(113)		:	58,36	5,00	4,49	:
	:	:		:	HCl			:
35	:	:		:				:
	:	:		:				:
	:	:		:				:
40	:	46160 A		:	55,65	5,15	4,47	:
	:	(114)		:	55,72	5,35	4,35	:
	:	:		:	HCl, 0,5 H2O			:
	:	:		:				:

45

50

55


5	46508 A (115)		54,27	4,55	4,37
			54,50	4,61	4,22
			HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O		
10	46509 A (116)		52,76	4,13	4,10
			52,52	4,26	3,97
			HCl		
15	46619 A (117)		51,84	5,27	7,32
20			51,72	5,53	7,09
			HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O		
25	46690 A (118)		52,68	4,90	6,58
			52,06	5,02	6,42
			2HCl		
30	47147 (119)		53,82	4,68	6,72
35			53,61	4,72	6,46
			HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O		
40	47678 A (120)		48,39	5,00	8,68
			48,21	5,23	8,28
			2HCl, H <sub>2</sub> O		




5	:	:	:	:	52,68	4,91	4,55	:
:	:	46261 A	:		:	52,91	5,01	4,47
:	:	(121)	:		:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	52,23	4,38	4,51	:
:	:	46445 A	:		:	51,89	4,53	4,33
10	:	(122)	:		:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	46158 A	:		:	55,47	4,97	4,46
15	:	(123)	:		:	55,57	4,97	4,43
:	:	:	:		:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	46157 A	:		:	54,05	4,84	4,34
20	:	(124)	:		:	54,10	4,91	4,28
:	:	:	:		:	HCl; 0,5 H <sub>2</sub> O	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
25	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	46511 A	:		:	53,87	4,52	4,19
:	:	(125)	:		:	53,69	4,75	4,05
30	:	:	:		:	HCl	:	:
:	:	:	:		:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
35	:	46288 A	:		:	56,30	5,35	4,39
:	:	(126)	:		:	55,91	5,29	4,56
:	:	:	:		:	HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
40	:	:	:	:	49,73	4,74	6,00	:
:	:	47348 A	:		:	50,13	4,72	5,84
:	:	(127)	:		:	2HCl, H <sub>2</sub> O	:	:
45	:	:	:		:	:	:	:




50

55

TABLEAU 7



n° SR		Analyse élémentaire		
exemple n°	T - Z	C	H	N
		Calculé %		
		Trouvé %		
		Sel		
46924 A	- CO - 	57,71	5,47	9,28
(128)		57,85	5,59	9,08
		2HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O		
46925 A	- CO - 	57,71	5,47	9,28
(129)		57,80	5,41	9,21
		2HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O		
46913 A	- CO - 	52,63	5,84	8,77
(130)		52,19	6,07	8,32
		3HCl, H <sub>2</sub> O		

	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	50,61	5,31	8,43
	:	46922 A	:	- CO	:	51,01	5,45
5	:	(131)	:		:	8,21	:
	:	:	:	:	:	2HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:
	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:
10	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	50,61	5,31	8,43
	:	46915 A	:	- CO	:	50,30	5,48
	:	(132)	:		:	8,16	:
	:	:	:	:	:	3HCl, 0,5 H <sub>2</sub> O	:
15	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	58,90	5,83	8,54
20	:	46813 A	:	- CO - NH	:	58,62	6,01
	:	(133)	:		:	8,42	:
	:	:	:	:	:	3HCl, H <sub>2</sub> O	:
	:	:	:	:	:	:	:
25	:	:	:	:	:	:	:

---

30

35


40






45

50




55

TABLEAU 8




-----					
Produit n° SR	m	Ar'	Z	F, °C ; Solv. recrist.	
(Exemple n°)				Sel	
-----					
46721 A	2			120-125	
(134)				éther	
				2HCl	
46827 A	2	"		107-110	
(135)				CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /éther isopropylique	
				HCl	
46890 A	2	"		118-123	
(136)				CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /Et <sub>2</sub> O	
				HCl	
47099 A	2	"		120-130	
(137)				CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> /Et <sub>2</sub> O	
				HCl	


5	:	:	:	:	:	:	:
:	:	47157 A	:	2	:	:	:
:	:	(138)	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
10	:	:	:	:	:	:	:
:	:	47221 A	:	2	:	:	:
:	:	(139)	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
15	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	47284 A	:	2	:	:	:
20	:	(140)	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
25	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	47437 A	:	2	:	:	:
30	:	(141)	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
35	:	47806 A	:	2	:	:	:
:	:	(142)	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
40	:	:	:	:	:	:	:
:	:	47036 A	:	2	:	:	:
:	:	(143)	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
45	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:




"




"



"



"







	:	:	:	:	:	:
	:	46769 A	:	2 :	"	:
	:	(144)	:	:	:	:
5	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
10	:	47000 A	:	2 :	"	:
	:	(145)	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
15	:	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:
	:	47580 A	:	3 :	"	:
	:	(146)	:	:	:	:
20	:	:	:	:	:	:

25  
EXEMPLE 147

30 Chlorhydrate de N[(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl]-dichloro-2,4 benzamide (+). SR 47050 A.



45 Les pouvoirs rotatoires des composés ci-dessous ont été mesurés à 25 °C.

50 A) N-(phényl-1 éthyl) $\beta$ (*tert*-butoxy carbonylaminométhyl) -dichloro-3,4 benzènepropanamide.

Etape 1

55 Dans un tricol de 2 litres balayé à l'azote, on introduit 39,6 ml de diisopropylamine en solution dans 200 ml de THF anhydre. On refroidit à -60 °C et additionne à cette température dans l'ordre :  
 - 176 ml d'une solution 1,6 M de butyllithium dans l'hexane,  
 - 50 g de dichloro-3,4 benzène acétonitrile dans 300 ml de THF, puis,  
 - 39,4 ml de bromoacétate de *tert*-butyle dans 100 ml de THF.

On laisse revenir la température à 0 °C en 2 heures 30. Le mélange est versé sur 3 l de solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium. On extrait 2 fois à l'éther, sèche sur sulfate de magnésium, évapore les solvants. L'huile obtenue est chromatographiée sur 1 kg de silice H. Elution avec un mélange cyclohexane/acétate d'éthyle : 95/5. On obtient ainsi 44,3 g de  $\beta$ -cyanodichloro-3,4 benzènepropanoate de *tert*-butyle.  
F = 67 °C.

#### Etape 2

Un mélange de 40 g du produit obtenu précédemment (étape 1), 700 ml d'éthanol absolu, 200 ml d'ammoniaque concentré (20 %) et 3 spatules de nickel Raney est agité sous atmosphère d'hydrogène pendant 5 heures. Après filtration du catalyseur et évaporation des solvants on obtient 38,8 g de  $\beta$ -aminométhylidichloro-3,4 benzènepropanoate de *tert*-butyle sous forme d'huile.

#### Etape 3

Une solution de 23,5 g du produit obtenu précédemment (étape 2) dans 150 ml de dichlorométhane est refroidie à -10 °C. On additionne 250 ml d'acide trifluoroacétique puis on laisse remonter la température à 20 °C en 1 h 30.

Après élimination des solvants, on obtient 27 g de trifluoroacétate de l'acide  $\beta$ -aminométhylidichloro-3,4 benzènepropanoïque sous forme d'huile.

#### Etape 4

A 27 g du produit obtenu précédemment (étape 3) en solution dans 150 ml d'eau, on additionne 150 ml de dioxanne puis 30 ml de triéthylamine, puis une solution de 23 g de dicarbonate de di-*tert*-butyle dans 50 ml de dioxanne. On chauffe à 100 °C pendant 1 heure. Le dioxanne est éliminé sous vide et la solution obtenue est lavée à l'éther isopropylique. La phase aqueuse est versée sur 1,5 l de solution tampon phosphate pH = 2. Après extraction à l'éther et séchage sur sulfate de magnésium on évapore les solvants. L'huile obtenue est cristallisée dans l'éther isopropylique, ce qui donne 20,3 g de l'acide  $\beta$ -(*tert*-butoxycarbonylaminométhyl)-dichloro-3,4 benzènepropanoïque.

#### Etape 5

A 10 g du produit obtenu précédemment (étape 4) en solution dans 150 ml de dichlorométhane on additionne dans l'ordre :

- 8 ml de triéthylamine,
- 3,5 g de S(-)  $\alpha$ -méthylbenzylamine,
- 14 g de BOP (hexafluorophosphate de benzotriazolyl N-oxytrisdiméthylaminophosphonium).

Après agitation à température ambiante pendant 1 heure, on lave à l'eau, puis avec une solution tampon phosphate pH = 2, puis avec une solution aqueuse saturée en bicarbonate de sodium. On sèche sur sulfate de magnésium, élimine les solvants sous vide, pour obtenir 12 g de [ N-(phényl-1 éthyl)] $\beta$ -(*tert*-butoxycarbonylaminométhyl)-dichloro-3,4 benzènepropanamide.

B) Ester méthylique de l'acide  $\beta$ -(dichloro-2,4 benzoylaminométhyl)-dichloro-3,4 benzènepropanoïque (+).

#### Etape 1

Séparation des diastéréoisomères du [N-(phényl-1 éthyl)]  $\beta$ -*tert*-butoxycarbonylaminométhyl-dichloro-3,4 benzènepropanamide.

Le produit brut est un mélange de deux diastéréoisomères. Ils sont séparables par chromatographie sur couche mince. On les sépare de façon préparative à l'aide d'une chromatographie sur 400 g de silice H en éluant avec un mélange toluène/acétate d'éthyle : 80/20. L'isomère le moins polaire sort en premier et on en recueille 5,8 g.

5 F = 146-147 °C

[ $\alpha$ ] D = -43,6° (c = 1 dans le chloroforme).

#### Etape 2

10

Une solution de 5 g du produit obtenu précédemment dans 10 ml de dioxanne et 50 ml d'acide chlorhydrique 6 N est chauffée à reflux durant la nuit. Après refroidissement de la solution, on la lave à l'éther puis on neutralise progressivement la phase aqueuse avec du bicarbonate de sodium solide jusqu'à pH = 7. On obtient alors un précipité que l'on filtre, lave à l'eau, à l'isopropanol puis à l'éther. Après

15 séchage, on obtient 1,88 g de l'acide  $\beta$ -aminométhyl-dichloro-3,4 benzènepropanoïque.

F = 202-204 °C.

#### Etape 3

20

A une suspension de 1,85 g de produit obtenu précédemment (étape 2) dans 20 ml de méthanol refroidie à -20 °C sous azote, on ajoute 1,10 ml de chlorure de thionyle puis on laisse remonter la température à 20 °C. 2 heures après, on ajoute 200 ml d'éther, filtre et lave à l'éther le produit qui a cristallisé. Après séchage, on obtient 2,15 g de  $\beta$ -aminométhyl-dichloro-3,4 benzènepropanoate de méthyle

25 (-). F = 184-186 °C

[ $\alpha$ ] D = -4,3° (c = 1 dans le méthanol).

#### Etape 4

30

A une solution de 2,0 g de produit obtenu précédemment (étape 3) et 1,5 g de triéthylamine dans 20 ml de dichlorométhane refroidie à 0 °C, on ajoute une solution de chlorure de dichloro-2,4 benzoyl (1,54 g) dans 5 ml de dichlorométhane. 5 mn après, on concentre à sec la solution, ajoute de l'eau et extrait à l'acétate d'éthyle. Le résidu obtenu est ensuite cristallisé dans l'éther isopropylique. On obtient ainsi 2,72 g

35 de  $\beta$ -(dichloro-2,4 benzoylaminoéthyl)-benzènepropanoate de méthyle (+).

F = 105-107 °C

[ $\alpha$ ] D = + 26,6° (c = 1 dans le chloroforme).

40 C) Ester méthylique de l'acide  $\beta$ -(dichloro-2,4 benzoylaminoéthyl)-dichloro-3,4 benzènepropanoïque (-).

#### Etape 1

45

En procédant comme il est décrit dans l'exemple 1 B) étape 1, on recueille l'isomère le plus polaire en éluant avec un mélange toluène/acétate d'éthyle : 80/20 puis 60/40. La concentration des fractions fournit 5,4 g de [N-(phényl-1 éthyl)]  $\beta$ -(*tert*-butoxycarbonyl-aminométhyl)-dichloro-3,4 benzènepropanamide.

F = 161-162 °C

[ $\alpha$ ] D = -18,4° (c = 1 dans le chloroforme).

50

#### Etape 2

En procédant comme il est décrit dans l'exemple 1 B) étape 2, on prépare l'acide  $\beta$ -aminométhyl-dichloro-3,4 benzènepropanoïque.

55 F = 202-204 °C

Etape 3

En procédant comme il est décrit dans l'exemple 1 B) étape 3, on prépare le  $\beta$ -aminométhyl-dichloro-3,4 benzènepropanoate de méthyle (+).

5 F = 184-185 °C

$[\alpha]_D = + 3,9^\circ$  (c = 1 dans le méthanol).

Etape 4

10

En procédant comme il est décrit dans l'exemple 1 B) étape 4, on prépare le  $\beta$ -(dichloro-2,4 benzoylaminométhyl)-dichloro-3,4 benzènepropanoate de méthyle (-).

F = 108-109 °C

$[\alpha]_D = -27,7^\circ$  (c = 1 dans le chloroforme).

15

D) Réduction des esters méthyliques de l'acide  $\beta$ -(dichloro-2,4 benzoylaminométhyl)- dichloro-3,4 benzènepropanoïque (+) ou (-).

20

On prépare tout d'abord une solution 0,5 M de borohydrure de calcium dans le THF en laissant agiter 3 heures une suspension de borohydrure de sodium (0,1 mole) et de chlorure de calcium (0,05 mole) dans 100 ml de THF. On ajoute ensuite 13 ml de cette solution à une solution de 2,5 g d'ester méthylique de l'acide  $\beta$ -(dichloro-2,4 benzoylaminométhyl)- dichloro-3,4 benzènepropanoïque (+) ou (-) dans 20 ml de THF. On laisse agiter durant la nuit. Le lendemain, la solution est refroidie à 0 °C puis hydrolysée avec de l'eau puis de l'acide chlorhydrique dilué. Après extraction à l'éther, on recueille l'alcool (+) ou (-) pratiquement pur sous forme d'huile.

25

E) Préparation des dérivés mésylates : méthane sulfonates du (dichloro-2,4 benzoylaminométhyl)- $\gamma$ -dichloro-3,4 benzènepropanol (+) ou (-).

30

1,3 g de l'alcool obtenu précédemment sont mis en solution dans 30 ml de dichlorométhane puis on ajoute à la solution refroidie à 0 °C, 0,5 ml de triéthylamine et 0,3 ml de chlorure de mésyle. Le mélange réactionnel est agité à 0 °C pendant 45 minutes, lavé 3 fois à l'eau glacée, décanté, séché sur  $MgSO_4$  et concentré sous vide.

35

Le résidu est chromatographié sur gel de silice, éluant : acétate d'éthyle/pentane 60/40. Les fractions pures sont concentrées sous vide.

Ainsi on obtient à partir de l'ester (+) un résidu qui est recristallisé de l'éther isopropylique pour fournir 1,1 g de méthanesulfonate du (dichloro-2,4 benzoylaminométhyl)- $\gamma$ -dichloro-3,4 benzènepropanol (+).

40

F = 74-77 °C

$[\alpha]_D = + 21,2^\circ$  (c = 1 dans le chloroforme).

Ainsi on obtient à partir de l'ester (-) en procédant comme ci-dessus, le méthanesulfonate du (dichloro-2,4 benzoylaminométhyl)- $\gamma$ -dichloro-3,4 benzènepropanol (-).

F = 72-76 °C

45

$[\alpha]_D = -22,5^\circ$  (c = 1 dans le chloroforme).

F) Préparation du chlorhydrate de N[(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl]-dichloro-2,4 benzamide (+). SR 47050 A.

50

0,6 g du mésylate (+) obtenu précédemment et 0,54 g de benzyl-4 pipéridine sont mis en solution dans 1 ml de diméthylformamide et le mélange réactionnel est chauffée à 60 °C pendant 30 minutes. On ajoute de l'eau et extrait à l'acétate d'éthyle. La phase organique est concentrée sous vide et le résidu est chromatographié sur gel de silice. Eluant : dichlorométhane/méthanol : 97/3.

55



Les fractions de produit pur sont concentrées sous vide, le résidu est dilué dans le dichlorométhane et l'addition d'éther chlorhydrique permet l'obtention du chlorhydrate.

m = 0,5 g

$[\alpha]_D = + 14,0^\circ$  (c = 1 dans le chloroforme).

## EXEMPLE 148



Chlorhydrate de N[(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl]-dichloro-2,4 benzamide (-). SR 47051 A.



En procédant de la même façon que précédemment (selon exemple 147 F) mais en utilisant comme produit de départ l'isomère (-) mésylate, on obtient le SR 47051 A.  
 $[\alpha]_D = -14,5^\circ$  ( $c = 1$  dans le chloroforme).

## EXEMPLE 149


En procédant comme il est décrit dans l'exemple 147 ci-dessus, on prépare :  
 - le chlorhydrate de N[(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (difluoro-3,4 phényl)-2 butyl]-dichloro-2,4 benzamide (-). SR 47243 A.




$[\alpha]_D = -8,5^\circ$  ( $c = 1$  dans le chloroforme).

## EXEMPLE 150

En procédant comme il est décrit dans l'exemple 147 ci-dessus, on prépare :  
 - le chlorhydrate de N[(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (difluoro-3,4 phényl)-2 butyl]-dichloro-2,4 benzamide (+). SR 47238 A.



5



10


$[\alpha]_D = +7,3^\circ$  ( $c = 1$  dans le chloroforme).

15


## EXEMPLE 151

20 Chlorhydrate de N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl] fluoro-4 naphthalène-1 carboxamide (+) et (-).

25



30



35

40

Etape 1

amino-1 (dichloro-3,4 phényl)-2 hydroxy-4 butane.

45

150 ml d'une solution saturée d'éther chlorhydrique sont ajoutés à 149 g de (tétrahydropyranyl-2 oxy)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 amino-1 butane en solution dans 700 ml de méthanol. Le mélange est agité pendant 1/2 heure à température ambiante, concentré sous vide et le résidu est repris dans 500 ml d'eau et lavé à l'éther. La phase aqueuse est alcalinisée avec une solution d'hydroxyde de sodium et extraite deux fois au

50

dichlorométhane. Les phases organiques sont séchées sur  $\text{MgSO}_4$ , filtrées et concentrées sous vide. Le résidu est repris dans 400 ml d'éther isopropylique et le mélange est agité pendant une heure à température ambiante. Le précipité est filtré et lavé à l'éther.

55

Etape 2

- Enantiomère (+) de l'amino-1 (dichloro-3,4 phényl)-2 hydroxy-4 butane.

A 59,65 g d'acide D (-) tartrique en solution dans 2 litres de méthanol chauffé au reflux, on ajoute 93 g du racémique, précédemment préparé selon l'étape 1, en solution dans 300 ml de méthanol. On laisse  
5 revenir à température ambiante, filtre les cristaux, lave au méthanol et sèche sous vide à 50 ° C sur P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

m = 64,8 g

[α] D = -5,2° (c = 1 dans l'eau).

On recristallise ensuite dans 2,96 l de méthanol, filtre les cristaux les lave au méthanol et sèche sous vide à 50 ° C sur P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

10 m = 45,3 g

[α] D = -4,5° (c = 1 dans l'eau)

F = 201 ° C.

Le D (-) tartrate est repris dans 250 ml d'eau, on alcalinise avec une solution concentrée d'hydroxyde de sodium et extrait avec 3 fois 200 ml de dichlorométhane, lave avec une solution saturée de chlorure de sodium, décante, sèche sur MgSO<sub>4</sub>, filtre et concentre sous vide. Le résidu est repris dans l'éther  
15 isopropylique, le mélange est agité pendant une heure à température ambiante, les cristaux sont filtrés et lavés à l'éther isopropylique.

m = 24,7 g

[α] D = +9,0° (c = 1 dans le méthanol)

20 F = 79-80 ° C.

Enantiomère (-) de l'amino-1 (dichloro-3,4 phényl)-2 hydroxy-4 butane.

25 En procédant comme précédemment et en utilisant l'acide L (+) tartrique on obtient l'énantiomère (-).

[α] D = -9,2° (c = 1 dans le méthanol)

F = 79-80 ° C.

### 30 Etape 3

N [(dichloro-3,4 phényl)-2 méthyloxy-4 butyl] fluoro-4 naphthalène-1 carboxamide (énantiomère (-)).

35 4,45 g de chlorure de l'acide fluoro-4 naphthoïque en solution dans 50 ml de dichlorométhane sont ajoutés goutte à goutte à -60 ° C à une solution de 5 g du produit obtenu précédemment (énantiomère (+)) dans 100 ml de dichlorométhane en présence de 2,6 g de triéthylamine. On agite le mélange pendant 15 minutes à -60 ° C et laisse remonter la température à -30 ° C. On ajoute alors 2,5 g de triéthylamine et 2,7 g de chlorure de mésyle et laisse revenir à température ambiante. On lave à l'eau sèche la phase organique  
40 sur MgSO<sub>4</sub>, et concentre sous vide. Le résidu est chromatographié sur gel de silice, éluant : dichlorométhane/méthanol 99,5/0,5.

Les fractions pures sont concentrées sous vide.

m = 8,4 g

[α] D = -22,8° (c = 1 dans le méthanol).

45

N- [(dichloro-3,4 phényl)-2 méthyloxy-4 butyl] fluoro-4 naphthalène-1 carboxamide (énantiomère (+)).

L'énantiomère (+) est obtenu en procédant comme décrit précédemment à l'étape 3 mais en utilisant  
50 l'énantiomère (-) de l'étape 2.

[α] D = +22,7° (c = 1 dans le méthanol).

### Etape 4

55

Chlorhydrate de N- [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl] fluoro-4 naphthalène-1 carboxamide. Enantiomère (-) SR 48225 A.

7 g de l'énantiomère (-) obtenu à l'étape 3 et 5,02 g de benzyl-4 pipéridine sont mis en solution dans 15 ml de diméthylformamide et le mélange réactionnel est chauffé à 70 °C pendant deux heures. Le mélange est versé sur de l'eau, extrait à l'acétate d'éthyle, les phases organiques sont lavées avec une solution saturée de chlorure de sodium, séchées sur MgSO<sub>4</sub> et concentrées sous vide. Le résidu est chromatographié sur gel de silice, éluant : dichlorométhane/méthanol 97/3.

Le fractions de produit pur sont concentrées sous vide, le résidu est dilué dans le dichlorométhane et l'addition d'éther chlorhydrique permet l'obtention du chlorhydrate.

m = 6,2 g

[α]<sub>D</sub> = -35,5° (c = 1 dans le méthanol).

Enantiomère (+). SR 48226 A

En procédant de la même façon que pour l'énantiomère (-) précédemment préparé mais en utilisant l'énantiomère (+) obtenu à l'étape 3, on obtient l'énantiomère (+).

m = 7 g

[α]<sub>D</sub> = +36,0° (c = 1 dans le méthanol).


## EXEMPLE 152 :

Chlorhydrate de N-méthyl-N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl] phénylacétamide. SR 48172 A.

A partir du chlorhydrate de (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 N-méthylamino-1 butane décrit dans l'étape a) de l'Exemple 98, par réaction avec le chlorure de l'acide phénylacétique selon le mode opératoire décrit dans l'Exemple 1, on obtient le composé SR 48172 A.

## Revendications

### 1. Un composé de formule



dans laquelle :

- m est un nombre entier de 1 à 3;

- Ar et Ar' représentent, indépendamment, un groupe thiényle; un groupe phényle non substitué, mono ou di-substitué par un atome d'halogène, par un alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, par un trifluorométhyle, par un alcoxy dans lequel l'alkyle est en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, par un hydroxyle, par un méthylènedioxy ; un groupe imidazolyle ; Ar' pouvant également être un groupe benzothiényne non substitué ou substitué par un halogène; un groupe naphthyle non substitué ou substitué par un halogène ; un groupe biphényle; un indolyle non substitué ou substitué sur l'azote par un groupe benzyle ;

- X représente l'hydrogène;

- X' représente l'hydrogène, un groupe hydroxyle, ou est réuni à X'' ci-dessous pour former une liaison carbone-carbone ;

. ou bien X et X', ensemble, forment un groupe oxo ou dialkylaminoalkyloxyimino de formule =N-O-(CH<sub>2</sub>)<sub>p</sub>-Am, où p est 2 ou 3 et Am est un groupe dialkylamino, chaque alkyle pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone;

- Y représente un atome d'azote ou un groupe C(X'') où X'' est l'hydrogène ou, avec X', forme une liaison carbone-carbone ;

- Q représente l'hydrogène, un groupe alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ou un groupe aminoalkyle de formule -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-Am', où q est 2 ou 3 et Am' est un groupe pipéridino, benzyl-4 pipéridino ou dialkylamino, chaque alkyle



pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone;

- R représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe  $(CH_2)_n-L$ , où n est un nombre entier de 2 à 6 et L est l'hydrogène ou un groupe amino,
- T représente un groupe choisi parmi

5



10 W étant un atome d'oxygène ou de soufre, et


- Z représente soit l'hydrogène, soit M ou OM lorsque T représente le groupe

15



soit M lorsque T représente le groupe


20



M représente l'hydrogène ou un alkyle droit ou ramifié en  $C_1-C_6$ ; un phénylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone, non substitué, mono ou polysubstitué sur le cycle  
 25 aromatique par un halogène, un hydroxy, un alcoxy de 1 à 4 atomes de carbone, un alkyle de 1 à 4 atomes de carbone; un pyridylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone; un naphthylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone; un pyridylthioalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone; un styryle; un (méthyl-1) imidazolyl-2 thioalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone; un oxo-1 phénylindan-3  
 30 yle-2; un groupe aromatique ou hétéroaromatique non substitué, mono ou polysubstitué;  
 ou un de ses sels avec des acides minéraux ou organiques.

2. Un composé optiquement pur de formule :

35



40 dans laquelle :

- \* signifie que l'atome de carbone ainsi marqué a une configuration absolue (+) ou (-) déterminée

- m, Ar et Ar', X, X', Y, Q, R, T et Z sont tels que définis dans la revendication 1.

ou un de ses sels avec des acides minéraux ou organiques.

3. N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl]-dichloro-2,4 benzamide ou un de ses sels  
 45 pharmaceutiquement acceptables.

4. N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (difluoro-3,4 phényl)-2 butyl]-dichloro-2,4 benzamide ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

5. N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl] fluoro-4 naphthalène-1 carboxamide ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

50 6. N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl]-dichloro-2,4 benzamide (+) ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

7. N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl]-dichloro-2,4 benzamide (-) ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

55 8. N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (difluoro-3,4 phényl)-2 butyl]-dichloro-2,4 benzamide (+) ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

9. N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (difluoro-3,4 phényl)-2 butyl]-dichloro-2,4 benzamide (-) ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.


10. N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl] fluoro-4 naphthalène-1 carboxamide (+) ou un

de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

11. N [(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl] fluoro-4 naphthalène-1 carboxamide (-) ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

12. Procédé pour la préparation de composés selon la revendication 1, caractérisé en ce que


5 a) on traite une amine libre de formule :



dans laquelle m, Ar' et Q sont tels que définis précédemment dans la revendication 1 ; R° représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-L°, où n est tel que défini dans la revendication 1, et L° est l'hydrogène ou un groupe amino protégé par un groupe N-protecteur ; et E représente un groupe hydroxy ou un groupe O-protégé tel que tétrahydropyran-2-yloxy, ou un groupe



où Ar, X et Y sont tels que définis dans la revendication 1 et X° représente le groupe X', tel que défini dans la revendication 1, dans lequel le groupe hydroxy est protégé par un groupe O-protecteur ; - soit avec un dérivé fonctionnel d'un acide de formule :




dans laquelle Z est tel que défini dans la revendication 1, lorsqu'on doit préparer un composé de formule (I) où T est -CO-,

30 - soit avec un iso(thio)cyanate de formule :




dans laquelle W et Z sont tels que définis dans la revendication 1, lorsqu'on doit préparer un composé de formule (I) où T est -C(W)-NH-, pour former le composé de formule :



40 b) puis, lorsque E représente le tétrahydropyranyloxy, on élimine le groupe tétrahydropyranyloxy par hydrolyse acide, l'hydrolyse pouvant alternativement avoir lieu à l'étape a) sur l'amine de départ de formule (II),


c) on traite l'alcanolamine N-substituée ainsi obtenue de formule:



avec le chlorure de méthanesulfonyle

d) on fait réagir le mésylate ainsi obtenu de formule :


55



5

avec une amine secondaire de formule :

10




15

dans laquelle Ar, Y, X et X' sont tels que définis dans la revendication 1,

e) on élimine les groupes O-protecteur et N-protecteur éventuels et on transforme éventuellement le produit ainsi obtenu en un de ses sels.

13. Procédé stéréosélectif pour la préparation de composés optiquement purs de formule (I\*), selon la revendication 2, caractérisé en ce que on traite un composé de formule :


20



25

dans un solvant, en milieu acide, pour fournir l'acide de formule :


30



35

qui est estérifié dans un alcool AlkOH, où Alk est un alkyle de 1 à 4 atomes de carbone, en milieu acide, puis on traite l'ester correspondant de formule :


40




dans laquelle Alk est tel que défini ci-dessus; Q, Ar' et m sont tels que définis dans la revendication 1 et

45 R<sup>°</sup> est tel que défini dans la revendication 12,

- soit avec un dérivé fonctionnel d'un acide de formule :




- soit avec un iso(thio)cyanate de formule :




50 Z et W étant tel que définis ci-dessus, dans la revendication 2, on soumet l'ester ainsi obtenu de formule :

55




à l'action d'un agent réducteur et on transforme l'alcool correspondant de formule :



5

en son ester méthanesulfonate de formule:



10


15 qui, par traitement avec une amine de formule :



20

dans laquelle Ar, X, X' et Y sont tels que définis dans la revendication 1 et déprotection éventuelle, donne le composé de formule (I').

25 14. Un composé de formule :




30

dans laquelle

- E<sup>°°</sup> représente un groupe tétrahydropyranyloxy, un groupe hydroxy, ou un groupe

35



40

- X<sup>°°</sup> représente l'hydrogène, un groupe hydroxyle libre ou protégé par un groupe O-protecteur, ou est réuni à X'' ci-dessous pour former une liaison carbone-carbone ;

. ou bien X et X<sup>°°</sup>, ensemble, forment un groupe oxo ou dialkylaminoalkoxyimino de formule =N-O-(CH<sub>2</sub>)<sub>p</sub>-Am, où p est 2 ou 3 et Am est un groupe dialkylamino, chaque alkyle pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone ;

45

- Y représente un atome d'azote ou un groupe C(X'') où X'' est l'hydrogène, ou, avec X<sup>°°</sup>, forme une liaison carbone-carbone ;

- R<sup>°°</sup> représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-L<sup>°°</sup>, où n est un nombre de 2 à 6 et L<sup>°°</sup> est l'hydrogène ou un groupe amino libre ou protégé par un groupe N-protecteur ;


50

- m, Ar et Ar', X et Q sont tels que définis dans la revendication 1 ou un de ses sels.

15. Composé selon la revendication 14, de formule (XVI), dans laquelle m, Q, Ar' sont tels que définis dans la revendication 1, E<sup>°°</sup> est un groupe hydroxy, R<sup>°°</sup> est R<sup>°</sup>, ce dernier ayant la signification définie dans la revendication 12, ledit composé étant sous forme optiquement pure.

55

16. Composé de formule :



5

dans laquelle :

- G est l'hydrogène, un groupe tétrahydropyranyle ou un groupe méthanesulfonyle ;
- $R^{\circ\circ}$  représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe  $(CH_2)_n-L^{\circ\circ}$ , où n est un nombre de 2 à 6 et  $L^{\circ\circ}$  est l'hydrogène ou un groupe amino libre ou protégé par un groupe N-protecteur ;
- m, Ar', Q, T et Z sont tels que définis dans la revendication 1.

ou un de ses sels.

17. Composé selon la revendication 16, de formule (V') dans laquelle m, Q, T, Ar' et Z sont tels que définis dans la revendication 1, G est l'hydrogène et  $R^{\circ\circ}$  est  $R^{\circ}$ , ce dernier ayant la signification définie dans la revendication 12, ledit composé étant sous forme optiquement pure.

18. Composé selon la revendication 15 de formule (V') dans laquelle m, Q, T, Ar' et Z sont tels que définis dans la revendication 1, G est un groupe méthanesulfonyle et  $R^{\circ\circ}$  est  $R^{\circ}$ , ce dernier ayant la signification définie dans la revendication 12, ledit composé étant sous forme optiquement pure.

19. Composition pharmaceutique contenant, en tant que principe actif, un composé de formule (I) ou (I') selon l'une des revendications 1 ou 2.

20. Composition pharmaceutique selon la revendication 19, sous forme d'unité de dosage, dans laquelle le principe actif est mélangé à au moins un excipient pharmaceutique.


21. Composition selon la revendication 20 contenant de 2,5 à 1000 mg de principe actif.

22. Composé selon la revendication 14, caractérisé en ce que  $E^{\circ\circ}$  représente un groupe hydroxy et  $R^{\circ\circ}$  représente l'hydrogène.

23. Chlorhydrate de N-méthyl-N[(benzyl-4 pipéridinyl)-1]-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl] phénylacétamide.

Revendications pour l'Etat contractant suivant: ES

- 30 1. Procédé pour la préparation de composés de formule :




35

dans laquelle :

- m est un nombre entier de 1 à 3;
- Ar et Ar' représentent, indépendamment, un groupe thiényle ; un groupe phényle non substitué, mono ou di-substitué par un atome d'halogène, par un alkyle en  $C_1-C_3$ , par un trifluorométhyle, par un alcoxy dans lequel l'alkyle est en  $C_1-C_3$ , par un hydroxyle, par un méthylènedioxy ; un groupe imidazolyle ; Ar' pouvant également être un groupe benzothiényne non substitué ou substitué par un halogène ; un groupe naphthyle non substitué ou substitué par un halogène ; un groupe biphényle ; un indolyle non substitué ou substitué sur l'azote par un groupe benzyle ;
- X représente l'hydrogène ;
- X' représente l'hydrogène, un groupe hydroxyle, ou est réuni à X'' ci-dessous pour former une liaison carbone-carbone ;
- ou bien X et X', ensemble, forment un groupe oxo ou dialkylaminoalkoxyimino de formule  $=N-O-(CH_2)_p-Am$ , où p est 2 ou 3 et Am est un groupe dialkylamino, chaque alkyle pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone ;
- Y représente un atome d'azote ou un groupe  $C(X'')$  où X'' est l'hydrogène ou, avec X', forme une liaison carbone-carbone ;
- Q représente l'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_4$  ou un groupe aminoalkyle de formule  $-(CH_2)_q-Am'$ , où q est 2 ou 3 et Am' est un groupe pipéridino, benzyl-4 pipéridino ou dialkylamino, chaque alkyle pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone ;
- R représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe  $(CH_2)_n-L$ , où n est un nombre entier de 2 à 6 et L est l'hydrogène ou un groupe amino,

- T représente un groupe choisi parmi




W étant un atome d'oxygène ou de soufre, et

- Z représente soit l'hydrogène, soit M ou OM lorsque T représente le groupe



15 soit M lorsque T représente le groupe




20 M représente l'hydrogène ou un alkyle droit ou ramifié en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ; un phénylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone, non substitué, mono ou polysubstitué sur le cycle aromatique par un halogène, un hydroxy, un alcoxy de 1 à 4 atomes de carbone, un alkyle de 1 à 4 atomes de carbone; un pyridylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un naphthylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un pyridylthioalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un styryle ; un (méthyl-1) imidazolyl-2 thioalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone; un oxo-1 phénylindan-3 yle-2 ; un groupe aromatique ou hétéroaromatique non substitué, mono ou polysubstitué;

ou un de ses sels avec des acides minéraux ou organiques,

30 caractérisé en ce que

a) on traite une amine libre de formule :




40 dans laquelle m, Ar' et Q sont tels que définis précédemment R<sup>°</sup> représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-L<sup>°</sup>, où n est tel que défini précédemment, et L<sup>°</sup> est l'hydrogène ou un groupe amino protégé par un groupe N-protecteur ; et E représente un groupe hydroxy, un groupe O-protégé tel que tétrahydropyran-2-yloxy, ou un groupe




50 où Ar, X et Y sont tels que définis précédemment et X<sup>°</sup> représente le groupe X', tel que défini précédemment, dans lequel le groupe hydroxy est protégé par un groupe O-protecteur :

- soit avec un dérivé fonctionnel d'un acide de formule ;




dans laquelle Z est tel que défini ci-dessus, lorsqu'on doit préparer un composé de formule (I) où T est -CO-,

55 - soit avec un iso(thio)cyanate de formule :




dans laquelle W et Z sont tels que définis ci-dessus, lorsqu'on doit préparer un composé de formule (I)

où T est -C(W)-NH-,  
pour former le composé de formule :




10 b) puis, lorsque E représente le tétrahydropyranyloxy, on élimine le groupe tétrahydropyranyle par hydrolyse acide douce, l'hydrolyse pouvant alternativement avoir lieu à l'étape a) sur l'amine de départ de formule (II),

c) on traite l'alcanolamine N-substituée ainsi obtenue de formule :




20 avec le chlorure de méthanesulfonyle

d) on fait réagir le mésylate ainsi obtenu de formule :




30 avec une amine secondaire de formule :



dans laquelle Ar, Y, X et X' sont tels que définis précédemment,

40 e) on élimine les groupes O-protecteur et N-protecteur éventuels et on transforme éventuellement le produit ainsi obtenu en un de ses sels.

2. Procédé pour la préparation de composés optiquement purs de formule :




dans laquelle :

50 - "\*" signifie que l'atome de carbone ainsi marqué a une configuration absolue (+) ou (-) déterminée ;


- m, Ar et Ar', X, X', Y, Q, R, T et Z sont tels que définis dans la revendication 1,

ou d'un de ses sels avec des acides minéraux ou organiques, caractérisé en ce qu'on traite un composé de formule :




5

dans un solvant, en milieu acide, pour fournir l'acide de formule:



10


15 qui est estérifié dans un alcool AlkOH, où Alk est un alkyle de 1 à 4 atomes de carbone, en milieu acide, puis on traite l'ester correspondant de formule :




20

25 dans laquelle Alk est tel que défini ci-dessus et Q, Ar', R° et m sont tels que définis dans la revendication 1,


- soit avec un dérivé fonctionnel d'un acide de formule :



- soit avec un iso(thio)cyanate de formule :




30 Z et W étant tels que définis dans la revendication 1, on soumet l'ester ainsi obtenu de formule :



35


à l'action d'un agent réducteur et on transforme l'alcool correspondant de formule :

40



45

en son ester méthanesulfonate de formule:




50

qui, par traitement avec une amine de formule :

55






5

dans laquelle Ar, X, X' et Y sont tels que définis dans la revendication 1 et déprotection éventuelle, donne le composé de formule (I'),

que l'on transforme éventuellement en un de ses sels.

10 3. Procédé pour la préparation de composés de formule :




15

dans laquelle

- E<sup>°°</sup> représente un groupe tétrahydropyranyloxy, un groupe hydroxy, ou un groupe

20



25

- X<sup>°°</sup> représente l'hydrogène, un groupe hydroxyle libre ou protégé par un groupe O-protecteur, ou est réuni à X' ci-dessous pour former une liaison carbone-carbone ;

. ou bien X et X<sup>°°</sup>, ensemble, forment un groupe oxo ou dialkylaminoalkoxyimino de formule =N-O-(CH<sub>2</sub>)<sub>p</sub>-Am, où p est 2 ou 3 et Am est un groupe dialkylamino, chaque alkyle pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone ;

30

- Y représente un atome d'azote ou un groupe C(X'') où X'' est l'hydrogène, ou, avec X<sup>°°</sup>, forme une liaison carbone-carbone ;

- R<sup>°°</sup> représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-L<sup>°°</sup>, où n est un nombre de 2 à 6 et L<sup>°°</sup> est l'hydrogène ou un groupe amino libre ou protégé par un groupe N-protecteur ;


35

- m, Ar et Ar', X et Q sont tels que définis dans la revendication 1

ou de l'un de ses sels,

caractérisé en ce que l'on soumet un nitrile de formule


40



45

dans laquelle E est tel que défini dans la revendication 1, à une hydrogénation dans un alcool en présence d'un catalyseur, pour obtenir l'amine libre primaire de formule :


50



55

ladite amine libre primaire étant ensuite


- soit isolée si l'on doit préparer des composés de formule (XVI) dans laquelle R<sup>°°</sup> est l'hydrogène, et les groupes O- et N-protecteurs étant ensuite éventuellement éliminés pour obtenir des composés de formule :



5

- soit, pour préparer des composés de formule (XVI) où  $R^{\circ\circ}$  est méthyle, traitée avec un chloroformiate, par exemple un chloroformiate de formule  $Cl-CO-O-Alk$  où  $Alk$  est un alkyle en  $C_1-C_4$ , pour obtenir les carbamates de formule :


10



15

qui sont ensuite réduits par un agent réducteur tel qu'un hydrure métallique, ou un hydrure de bore, dans un solvant tel que l'éther ou le toluène à une température comprise entre la température ambiante et  $60^\circ C$ , pour obtenir une méthylamine de formule :


20



25


et les groupes O- et N-protecteurs étant ensuite éventuellement éliminés pour obtenir un composé de formule :

30




35

- soit pour préparer les composés de formule (XVI) où  $R^{\circ\circ}$  est un groupe  $-(CH_2)_n-L^{\circ\circ}$ , où  $n$  et  $L^{\circ\circ}$  sont tels que définis ci-dessus, traitée avec un dérivé fonctionnel réactif de l'acide de formule :



40


pour obtenir un amide de formule :



45


dans laquelle  $m$ ,  $n$ ,  $E$ ,  $Ar'$ ,  $Q$  et  $L^{\circ\circ}$  sont tels que définis dans la revendication 1, l'amide (X) étant ensuite réduite pour donner le composé de formule :

50



55

et les groupes O et N-protecteurs étant ensuite éventuellement éliminés pour obtenir un composé de formule :




5

ces composés étant susceptibles de donner des sels avec des acides optiquement actifs afin d'obtenir des composés optiquement purs.

4. Procédé pour la préparation de composés de formule :

10



15


dans laquelle :

- G est l'hydrogène, un groupe tétrahydropyranyle ou un groupe méthanesulfonyle ;
  - $R^{\circ\circ}$  représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe  $(CH_2)_n-L^{\circ\circ}$ , où n est un nombre de 2 à 6
  - et  $L^{\circ\circ}$  est l'hydrogène ou un groupe amino libre ou protégé par un groupe N-protecteur ;
  - m,  $Ar'$ , Q, T et Z sont tels que définis dans la revendication 1, ou d'un de leurs sels,
- caractérisé en ce que :

20

- a) on traite une amine libre de formule :

25




30

dans laquelle G, m,  $Ar'$  et Q sont tels que définis ci-dessus, et  $R^{\circ}$  représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe  $(CH_2)_n-L^{\circ}$ , où n est un nombre de 2 à 6 et  $L^{\circ}$  est l'hydrogène ou un groupe amino protégé par un groupe N-protecteur,

- soit avec un dérivé fonctionnel d'un acide de formule :

35



dans laquelle Z est tel que défini dans la revendication 1, lorsqu'on doit préparer un composé de formule (V') où T est -CO-,

- soit avec un iso(thio)cyanate de formule :



40


dans laquelle W et Z sont tels que définis dans la revendication 1, lorsqu'on doit préparer un composé de formule

(V') où T est -C(W)-NH;

45


pour former le composé de formule :

50



- b) puis lorsque G représente un groupe tétrahydropyranyle, on élimine ce groupe par hydrolyse acide pour obtenir l'alcanolamine N-substituée de formule :


55



5

c) puis éventuellement, on traite cette alcanolamine avec le chlorure de méthanesulfonyle pour obtenir le mésylate de formule :

10



15

d) on élimine éventuellement les groupes N-protecteurs après chaque étape, et on transforme éventuellement le produit ainsi obtenu en un de ses sels.

5. Procédé selon la revendication 1 pour la préparation du N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl ]-dichloro-2,4 benzamide ou d'un de ses sels, **caractérisé en ce qu'on utilise :**

- 20 - une amine libre de formule (II) dans laquelle  $m = 2$  ;  $\text{Ar}'$  est un groupe dichloro-3,4-phényl ; Q et  $\text{R}^\circ$  représentent l'hydrogène ;  
 - un dérivé fonctionnel d'un acide de formule (III) dans laquelle Z est un groupe 2,4-dichlorophényl ;  
 - et une amine secondaire de formule (VII) dans laquelle Ar est un groupe phényl ; X et  $\text{X}'$  représentent l'hydrogène ; et Y représente -CH.

25 6. Procédé selon la revendication 1 pour la préparation du N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (difluoro-3,4 phényl)-2 butyl ]-dichloro-2,4 benzamide ou d'un de ses sels, **caractérisé en ce qu'on utilise :**

- une amine libre de formule (II) dans laquelle  $m = 2$  ;  $\text{Ar}'$  est un groupe difluoro-3,4 phényl ; Q et  $\text{R}^\circ$  représentent l'hydrogène ;  
 - un dérivé fonctionnel d'un acide de formule (III) dans laquelle Z est un groupe 2,4-dichlorophényl ;  
 30 - et une amine secondaire de formule (VII) dans laquelle Ar est un groupe phényl ; X et  $\text{X}'$  représentent l'hydrogène ; et Y représente -CH.

7. Procédé selon la revendication 1 pour la préparation du N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl ] fluoro-4-naphtalène-1 carboxamide ou d'un de ses sels, **caractérisé en ce qu'on utilise :**

- 35 - une amine libre de formule (II) dans laquelle  $m = 2$  ;  $\text{Ar}'$  est un groupe dichloro-3,4 phényl ; Q et  $\text{R}^\circ$  représentent l'hydrogène ;  
 - un dérivé fonctionnel d'un acide de formule (III) dans laquelle Z est un groupe fluoro-4-naphtyl-1 ;  
 - et une amine secondaire de formule (VII) dans laquelle Ar est un groupe phényl ; X et  $\text{X}'$  représentent l'hydrogène ; et Y représente -CH.

40 8. Procédé selon la revendication 2 pour la préparation du N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl ]-dichloro-2,4 benzamide sous forme optiquement pure (+) ou (-) ou d'un de ses sels, **caractérisé en ce qu'on utilise :**


- un composé de formule (XVII\*) dans laquelle  $m = 2$  ;  $\text{Ar}'$  est un groupe dichloro-3,4 phényl ; et  $\text{R}^\circ$  est l'hydrogène,  
 45 - un dérivé fonctionnel d'un acide de formule (III) dans laquelle Z est un groupe 2,4-dichlorophényl ;  
 - et une amine de formule (VII) dans laquelle Ar est un groupe phényl ; X et  $\text{X}'$  représentent l'hydrogène ; et Y représente -CH.

9. Procédé selon la revendication 2 pour la préparation du N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (difluoro-3,4 phényl)-2 butyl ]-dichloro-2,4 benzamide sous forme optiquement pure (+) ou (-) ou d'un de ses sels, **caractérisé en ce qu'on utilise :**

- 50 - un composé de formule (XVII\*) dans laquelle  $m = 2$  ;  $\text{Ar}'$  est un groupe difluoro-3,4 phényl ; et  $\text{R}^\circ$  est l'hydrogène,  
 - un dérivé fonctionnel d'un acide de formule (III) dans laquelle Z est un groupe 2,4-dichlorophényl ;  
 - et une amine secondaire de formule (VII) dans laquelle Ar est un groupe phényl ; X et  $\text{X}'$  représentent l'hydrogène ; et Y représente -CH.


55 10. Procédé selon la revendication 2 pour la préparation du N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl ] fluoro-4 naphtalène-1 carboxamide sous forme optiquement pure (+) ou (-), caractérisé en ce qu'on utilise :

- un composé de formule (XII\*) dans laquelle  $m = 2$  ;  $Ar'$  est un groupe dichloro-3,4 phényl ; et  $R^\circ$  est l'hydrogène,  
 - un dérivé fonctionnel d'un acide de formule (III) dans laquelle Z est un groupe fluoro-4-naphtyl-1 ;  
 - et une amine secondaire de formule (VII) dans laquelle Ar est un groupe phényl ; X et X' représentent l'hydrogène ; et Y représente -CH.  
 11. Procédé pour la préparation d'un composé optiquement pur de formule :




dans laquelle


- 15 - "\*" signifie que l'atome de carbone ainsi marqué a une configuration (+) ou (-) déterminée ;  
 - m,  $Ar'$ , Q,  $R^\circ$ , T et Z sont tels que définis dans la revendication 1 ou d'un de ses sels avec des acides minéraux ou organiques,  
 caractérisé en ce qu'on traite un composé de formule :



25 dans un solvant, en milieu acide, pour fournir l'acide de formule :




- qui est estérifié dans un alcool  $AlkOH$ , où Alk est un alkyle de 1 à 4 atomes de carbone, en milieu acide,  
 35 puis on traite l'ester correspondant de formule :




dans laquelle Alk est tel que défini ci-dessus, et Q,  $Ar'$ ,  $R^\circ$  et m sont tels que définis dans la revendication 1,


- 45 - soit avec un dérivé fonctionnel d'un acide de formule :



- soit avec un iso(thio)cyanate de formule :




Z et W étant tels que définis dans la revendication 1, on soumet l'ester ainsi obtenu de formule :




55 à l'action d'un agent réducteur, le produit obtenu étant éventuellement soumis à une déprotection et transformé en un de ses sels.

12. Procédé pour la préparation d'un composé optiquement pur de formule :




dans laquelle


- 10 - "\*" signifie que l'atome de carbone ainsi marqué a une configuration (+) ou (-) déterminée ;  
 - m, Ar', Q, R°, T et Z sont tels que définis dans la revendication 1  
 ou d'un de ses sels avec des acides minéraux ou organiques, caractérisé en ce qu'on traite un composé de formule :



dans un solvant, en milieu acide, pour fournir l'acide de formule :




qui est estérifié dans un alcool AlkOH, où Alk est un alkyle de 1 à 4 atomes de carbone, en milieu acide, puis on traite l'ester correspondant de formule :




dans laquelle Alk est tel que défini ci-dessus et Q, Ar', R° et m sont tels que définis dans la revendication 1,


- 40 - soit avec un dérivé fonctionnel d'un acide de formule :




- soit avec un iso(thio)cyanate de formule :



Z et W étant tels que définis dans la revendication 1, on soumet l'ester ainsi obtenu de formule :




à l'action d'un agent réducteur et on transforme l'alcool correspondant de formule :



en son ester méthanesulfonate, le produit obtenu étant éventuellement soumis à une déprotection et transformé en un de ses sels.

13. Procédé selon la revendication 3 pour la préparation de composés de formule :




dans laquelle

-  $E^{\circ\circ}$  représente un groupe hydroxy,

-  $R^{\circ\circ}$  représente l'hydrogène,

- m, Q et  $Ar'$  sont tels que définis dans la revendication 3, ou de l'un de ses sels,

caractérisé en ce que l'on soumet un nitrile de formule



dans laquelle E est un groupe hydroxy ou un groupe O-protecteur tel que tétrahydropyranyloxy à une hydrogénation dans un alcool en présence d'un catalyseur, suivie de l'élimination du groupe O-protecteur éventuel, et en ce que l'on transforme éventuellement le composé obtenu en l'un de ses sels.

14. Procédé selon la revendication 1 pour la préparation du chlorhydrate de N-méthyl-N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl ] phénylacétamide, caractérisé en ce qu'on utilise :

- une amine libre de formule (I) dans laquelle  $m = 2$  ;  $Ar'$  est un groupe (dichloro-3,4 phényl) ; Q est l'hydrogène et  $R^{\circ}$  est méthyle;

- un dérivé fonctionnel d'un acide de formule (III) dans laquelle Z est un groupe benzyle,


- et une amine secondaire de formule (VII) dans laquelle  $Ar$  est un groupe phényl; X et  $X'$  représentent l'hydrogène; et Y représente -CH.

15. Procédé pour la préparation d'une composition pharmaceutique caractérisé en ce que l'on mélange, en tant que principe actif, un composé préparé selon le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à

14 avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable.

Revendications pour l'Etat contractant suivant: GR

1. Un composé de formule



dans laquelle :

- m est un nombre entier de 1 à 3;

-  $Ar$  et  $Ar'$  représentent, indépendamment, un groupe thiényl; un groupe phényle non substitué, mono ou di-substitué par un atome d'halogène, par un alkyle en  $C_1-C_3$ , par un trifluorométhyle, par un alcoxy dans lequel l'alkyle est en  $C_1-C_3$ , par un hydroxyle, par un méthylènedioxy ; un groupe imidazole ;  $Ar'$  pouvant également être un groupe benzothiényl non substitué ou substitué par un halogène ; un groupe naphthyle non substitué ou substitué par un halogène ; un groupe biphényl; un indolyle non substitué ou substitué sur l'azote par un groupe benzyle ;

- X représente l'hydrogène;

-  $X'$  représente l'hydrogène, un groupe hydroxyle, ou est réuni à X ci-dessous pour former une liaison carbone-carbone ;

. ou bien X et  $X'$ , ensemble, forment un groupe oxo ou dialkylaminoalkoxyimino de formule  $=N-O-(CH_2)_p-$

Am, où p est 2 ou 3 et Am est un groupe dialkylamino, chaque alkyle pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone;

- Y représente un atome d'azote ou un groupe C(X'') où X'' est l'hydrogène ou, avec X', forme une liaison carbone-carbone ;

5 - Q représente l'hydrogène, un groupe alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ou un groupe aminoalkyle de formule -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-Am', où q est 2 ou 3 et Am' est un groupe pipéridino, benzyl-4 pipéridino ou dialkylamino, chaque alkyle pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone;

- R représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-L, où n est un nombre entier de 2 à 6 et L est l'hydrogène ou un groupe amino,

10 - T représente un groupe choisi parmi



15

W étant un atome d'oxygène ou de soufre, et


- Z représente soit l'hydrogène, soit M ou OM lorsque T représente le groupe

20



soit M lorsque T représente le groupe

25




M représente l'hydrogène ou un alkyle droit ou ramifié en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ; un phénylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone, non substitué, mono ou polysubstitué sur le cycle aromatique par un halogène, un hydroxy, un alcoxy de 1 à 4 atomes de carbone, un alkyle de 1 à 4 atomes de carbone; un pyridylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un naphthylalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un pyridylthioalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un styryle ; un (méthyl-1) imidazolyl-2 thioalkyle dans lequel le groupe alkyle comprend de 1 à 3 atomes de carbone ; un oxo-1 phénylindan-3 yle-2 ; un groupe aromatique ou hétéroaromatique non substitué, mono ou polysubstitué;

30 ou un de ses sels avec des acides minéraux ou organiques.

2. Un composé optiquement pur de formule :

40



45

dans laquelle :

- "\*" signifie que l'atome de carbone ainsi marqué a une configuration absolue (+) ou (-) déterminée ;

- m, Ar et Ar', X, X', Y, Q, R, T et Z sont tels que définis dans la revendication 1.

ou un de ses sels avec des acides minéraux ou organiques.

50 3. N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl ]-dichloro-2,4 benzamide ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

4. N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (difluoro-3,4 phényl)-2 butyl ]-dichloro-2,4 benzamide ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

55 5. N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl ] fluoro-4 naphthalène-1 carboxamide ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

6. N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl ]-dichloro-2,4 benzamide (+) ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

7. N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl ]-dichloro-2,4 benzamide (-) ou un de ses sels



pharmaceutiquement acceptables.


8. N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (difluoro-3,4 phényl)-2 butyl ]-dichloro-2,4 benzamide (+) ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

9. N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (difluoro-3,4 phényl)-2 butyl ]-dichloro-2,4 benzamide (-) ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

10. N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl ] fluoro-4 naphtalène-1 carboxamide (+) ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

11. N [ (benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl ] fluoro-4 naphtalène-1 carboxamide (-) ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

12. Procédé pour la préparation de composés selon la revendication 1, caractérisé en ce que a) on traite une amine libre de formule :




dans laquelle m, Ar' et Q sont tels que définis précédemment dans la revendication 1 ; R<sup>o</sup> représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-L<sup>o</sup>, où n est tel que défini dans la revendication 1, et L<sup>o</sup> est l'hydrogène ou un groupe amino protégé par un groupe N-protecteur ; et E représente un groupe hydroxy ou un groupe O-protégé tel que tétrahydropyran-2-yloxy, ou un groupe



où Ar, X et Y sont tels que définis dans la revendication 1 et X<sup>o</sup> représente le groupe X', tel que défini dans la revendication 1, dans lequel le groupe hydroxy est protégé par un groupe O-protecteur ;


- soit avec un dérivé fonctionnel d'un acide de formule :




dans laquelle Z est tel que défini dans la revendication 1, lorsqu'on doit préparer un composé de formule (I)

où T est -CO-,


- soit avec un iso(thio)cyanate de formule :



dans laquelle W et Z sont tels que définis dans la revendication 1, lorsqu'on doit préparer un composé de formule (I) où T est




pour former le composé de formule :




b) puis, lorsque E représente le tétrahydropyranyloxy, on élimine le groupe tétrahydropyranyle par hydrolyse acide, l'hydrolyse pouvant alternativement avoir lieu à l'étape a) sur l'amine de départ de formule (II),

c) on traite l'alcanolamine N-substituée ainsi obtenue de formule:



5


avec le chlorure de méthanesulfonyle  
d) on fait réagir le mésylate ainsi obtenu de formule :



10

15

avec une amine secondaire de formule :




20

dans laquelle Ar, Y, X et X' sont tels que définis dans la revendication 1,

25 e) on élimine les groupes O-protecteur et N-protecteur éventuels et on transforme éventuellement le produit ainsi obtenu en un de ses sels.

13. Procédé stéréosélectif pour la préparation de composés optiquement purs de formule (I\*), selon la revendication 2, caractérisé en ce que on traite un composé de formule :


30



35


dans un solvant, en milieu acide, pour fournir l'acidoaminoacide de formule:

40




45 qui est estérifié dans un alcool AlkOH, où Alk est un alkyle de 1 à 4 atomes de carbone, en milieu acide, puis on traite l'ester correspondant de formule :

50




dans laquelle Alk est tel que défini ci-dessus; Q, Ar' et m sont tels que définis dans la revendication 1 et R' est tel que défini dans la revendication 12,


55 - soit avec un dérivé fonctionnel d'un acide de formule :




- soit avec un iso(thio)cyanate de formule :




Z et W étant tel que définis ci-dessus, dans la revendication 2, on soumet l'ester ainsi obtenu de formule :




à l'action d'un agent réducteur et on transforme l'alcool correspondant de formule :



en son ester méthanesulfonate de formule:




qui, par traitement avec une amine de formule :



dans laquelle Ar, X, X' et Y sont tels que définis dans la revendication 1 et déprotection éventuelle, donne le composé de formule (I').


14. Un composé de formule :



dans laquelle

- E<sup>°°</sup> représente un groupe tétrahydropyranyloxy, un groupe hydroxy, ou un groupe

45



50

- X<sup>°°</sup> représente l'hydrogène, un groupe hydroxyle libre ou protégé par un groupe O-protecteur, ou est réuni à X' ci-dessous pour former une liaison carbone-carbone ;


ou bien X et X<sup>°°</sup>, ensemble, forment un groupe oxo ou dialkylaminoalkyloxyimino de formule =N-O-(CH<sub>2</sub>)<sub>p</sub>-Am, où p est 2 ou 3 et Am est un groupe dialkylamino, chaque alkyle pouvant contenir de 1 à 4 atomes de carbone ;

- Y représente un atome d'azote ou un groupe C(X'') où X'' est l'hydrogène, ou, avec X<sup>°°</sup>, forme une liaison carbone-carbone;

- $R^{\bullet\bullet}$  représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe  $(CH_2)_n-L^{\bullet\bullet}$ , où n est un nombre de 2 à 6 et  $L^{\bullet\bullet}$  est l'hydrogène ou un groupe amino libre ou protégé par un groupe N-protecteur ;
- m, Ar et Ar', X et Q sont tels que définis dans la revendication 1 ou un de ses sels.

- 5 15. Composé selon la revendication 14, de formule (XVI), dans laquelle m, Q, Ar' sont tels que définis dans la revendication 1,  $E^{\bullet\bullet}$  est un groupe hydroxy,  $R^{\bullet\bullet}$  est  $R^{\bullet}$ , ce dernier ayant la signification définie dans la revendication 12, ledit composé étant sous forme optiquement pure.
16. Composé de formule :

10



15

dans laquelle :

- G est l'hydrogène, un groupe tétrahydropyranyle ou un groupe méthanesulfonyle ;
- $R^{\bullet\bullet}$  représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe  $(CH_2)_n-L^{\bullet\bullet}$ , où n est un nombre de 2 à 6 et  $L^{\bullet\bullet}$  est l'hydrogène ou un groupe amino libre ou protégé par un groupe N-protecteur ;
- m, Ar', Q, T et Z sont tels que définis dans la revendication 1. ou un de ses sels.

20

17. Composé selon la revendication 16, de formule (V') dans laquelle m, Q, T, Ar' et Z sont tels que définis dans la revendication 1, G est l'hydrogène et  $R^{\bullet\bullet}$  est  $R^{\bullet}$ , ce dernier ayant la signification définie dans la revendication 12, ledit composé étant sous forme optiquement pure.

18. Composé selon la revendication 15 de formule (V') dans laquelle m, Q, T, Ar' et Z sont tels que définis dans la revendication 1, G est un groupe méthanesulfonyle et  $R^{\bullet\bullet}$  est  $R^{\bullet}$ , ce dernier ayant la signification définie dans la revendication 12, ledit composé étant sous forme optiquement pure.

25

19. Composé selon la revendication 14, caractérisé en ce que  $E^{\bullet\bullet}$  représente un groupe hydroxy et  $R^{\bullet\bullet}$  représente l'hydrogène.

20. Chlorhydrate de N-méthyl-N[(benzyl-4 pipéridinyl-1)-4 (dichloro-3,4 phényl)-2 butyl] phénylacétamide.

30

21. Procédé pour la préparation d'une composition pharmaceutique, caractérisé en ce que l'on mélange, en tant que principe actif, un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 et 14 à 20 avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable.

35

40

45

50

55

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) Numéro de publication:

**0 428 434 A3**

(12)

**DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(21) Numéro de dépôt: 90403125.9

(22) Date de dépôt: 06.11.90

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **C07D 211/14**, C07D 409/06,  
C07D 401/06, C07D 401/12,  
C07D 409/12, C07D 413/12,  
C07D 405/12, C07D 211/32,  
C07D 211/22, C07D 211/70,  
C07D 295/13

(30) Priorité: **06.11.89 FR 8914517**  
**15.06.90 FR 9007534**

(43) Date de publication de la demande:  
**22.05.91 Bulletin 91/21**

(84) Etats contractants désignés:  
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE**

(88) Date de publication différée du rapport de  
recherche: **09.10.91 Bulletin 91/41**

(71) Demandeur: **SANOFI S.A.**  
**40, Avenue George V**  
**F-75008 Paris(FR)**


(72) Inventeur: **Emonds-Ait, Xavier**

**La Balajade**  
**F-34980 Combaillaux(FR)**  
Inventeur: **Goulaoulc, Pierre**  
**224, avenue Jacques Carties-Bât. A**  
**F-34000 Montpellier(FR)**  
Inventeur: **Proietto, Vincenzo**  
**1, Cour de Merle**  
**F-34680 St. Georges d'Orques(FR)**  
Inventeur: **Van Broeck, Didier**  
**367 avenue du Champ des Moulins**  
**F-34570 Murviel Les Montpellier(FR)**

(74) Mandataire: **Gillard, Marie-Louise et al**  
**Cabinet Beau de Loménie 55, Rue**  
**d'Amsterdam**  
**F-75008 Paris(FR)**

(54) **Composés aromatiques aminés et leurs énantiomères, procédé pour leur préparation et compositions pharmaceutiques les contenant**

(57) L'invention concerne des composés de formule



dans laquelle :

- m est un nombre entier de 1 à 3 ;
- Ar et Ar' représentent, indépendamment, un groupe thiényle, un groupe phényle substitué ou non substitué; un groupe imidazolyle; Ar' pouvant également être un groupe benzothiényne non substitué ou substitué par un halogène; un groupe naphthyle non substitué ou substitué par un halogène; un groupe biphényle; un indolyle non substitué ou substitué;
- X représente l'hydrogène;
- X' représente l'hydrogène, un groupe hydroxyle, ou est réuni à X'' ci-dessous pour former une liaison carbone-carbone;

**EP 0 428 434 A3**


. ou bien X et X', ensemble, forment un groupe oxo ou dialkylaminoalkoxyimino de formule =N-O-(CH<sub>2</sub>)<sub>p</sub>-Am, où p est 2 ou 3 et Am est un groupe dialkylamino;

- Y représente un atome d'azote ou un groupe C(X'') où X'' est l'hydrogène ou, avec X', forme une liaison carbone-carbone;

- Q représente l'hydrogène, un groupe alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ou un groupe aminoalkyle de formule -(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>-Am', où q est 2 ou 3 et Am' est un groupe pipéridino, benzyl-4 pipéridino ou dialkylamino;

- R représente l'hydrogène, un groupe méthyle ou un groupe (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-L, où n est un nombre entier de 2 à 6 et L est l'hydrogène ou un groupe amino,

- T représente un groupe choisi parmi




W étant un atome d'oxygène ou de soufre, et

- Z représente soit l'hydrogène, soit M ou OM lorsque T représente le groupe



soit M lorsque T représente le groupe



M représente l'hydrogène ou un alkyle droit ou ramifié; un phénylalkyle non substitué ou substitué; un pyridylalkyle; un naphthylalkyle; un pyridylthioalkyle; un styryle; un (méthyl-1) imidazolyl-2 thioalkyle ; un oxo-1 phénylindan-3 yle-2; un groupe aromatique ou hétéroaromatique non substitué ou substitué; ou un de leurs sels avec des acides minéraux ou organiques.

Application : antagonistes des récepteurs des neurokinines.



Office européen  
des brevets

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 90 40 3125

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
A	EP-A-0 226 516 (TERUMO) * Revendications 1,5 *	1,3-11, 19-21, 23	C 07 D 211/14 C 07 D 409/06 C 07 D 401/06
A	EP-A-0 308 328 (SANOFI) * Abrégé; revendication 1 *	1,3-11, 23	C 07 D 401/12 C 07 D 409/12 C 07 D 413/12
A	EP-A-0 288 352 (SANOFI) * Abrégé; revendication 1 *	1,3-11, 23	C 07 D 405/12 C 07 D 211/32 C 07 D 211/22
X	CHEMISCHE BERICHTE, vol. 101, 1968, pages 1120-1130; C. METZGER et al.: "Cycloadditionen von N-Alkyl-iminodithiokohlensäure-dialkyles tern mit Ketenen" * Voir tableau 2; composés 46,47,50,52,65 *	14	C 07 D 211/70 C 07 D 295/13
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 54, résumé no. 19631a, Columbus, Ohio, US; E. TESTA et al.: "2,4-Azetidinediones", & HELV. CHIM. ACTA. 42, 2370-9(1959) * Composé VI *	14	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 54, 1960, résumé no. 3361c, Columbus, Ohio, US; E. TESTA et al.: "Substances acting on the central nervous system. X. Synthesis of 3,3-disubstituted-2-azetidiones", & ANN. 625, 95-8(1959); CF. C.A. 53, 20013h * Composé 1 *	14	C 07 D 211/00 C 07 D 295/00 C 07 D 401/00 C 07 D 405/00 C 07 D 409/00 C 07 D 413/00 C 07 D 417/00 C 07 C 215/00
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 13-02-1991	Examinateur KISSLER B.E.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

EP-0 FORM 1503 (04.82) (P.0400)



Office européen  
des brevets

## REVENDEICATIONS DONNANT LIEU AU PAIEMENT DE TAXES

La présente demande de brevet européen comportait lors de son dépôt plus de dix revendications.

- ☐ Toutes les taxes de revendication ayant été acquittées dans les délais prescrits, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour toutes les revendications.
- ☐ Une partie seulement des taxes de revendication ayant été acquittée dans les délais prescrits, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour les dix premières revendications ainsi que pour celles pour lesquelles les taxes de revendication ont été acquittées.
- à savoir les revendications:
- ☐ Aucune taxe de revendication n'ayant été acquittée dans les délais prescrits, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour les dix premières revendications.

## x ABSENCE D'UNITE D'INVENTION

La division de la recherche estime que la présente demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence relative à l'unité d'invention et concerne plusieurs inventions ou pluralités d'inventions.

à savoir:

1. Revendications 1-13, 19-21, 23.
2. Revendications 14-18, 22: Les intermédiaires des revendications 14-18 et 22 n'ont été cherchés que dans la mesure où ils contiennent ou un groupe pipéridine ou pipérazine. Les autres intermédiaires ne contiennent pas les caractéristiques intrinsèques des produits finaux de l'invention.

- ☒ Toutes les nouvelles taxes de recherche ayant été acquittées dans les délais impartis, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour toutes les revendications.
- ☐ Une partie seulement des nouvelles taxes de recherche ayant été acquittée dans les délais impartis, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées.
- à savoir les revendications:
- ☐ Aucune nouvelle taxe de recherche n'ayant été acquittée dans les délais impartis, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications.
- à savoir les revendications:





DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. CL5)
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 61, 1964, résumé no. 14614a-14615e, Columbus, Ohio, US; E. TESTA: "Substances acting on the central nervous system. XLI. New compounds derived from 3-phenyl-3-ethyl-1-propionylazetidine", ANN. 676, 151-60(1964); CF. CA 61, 3050e, 12005c * Colonne 14615c, composé XVI, EtNHCH2CHPhCH2OH * ---	14	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 81, 1974, page 458, résumé no. 91445k, Columbus, Ohio, US; V.A. DOBRINA et al: "Synthesis and study of adrenolytic substances. IV. Pyrroxan and related compounds", & KHIM.-FARM. ZH. 1974, 8(6), 14-17 * Composé I * ---	14,22	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 70, 1969, page 329, résumé no. 47380j, Columbus, Ohio, US; H.W. SCHUBERT et al: "New syntheses of 2-amino-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazines", & ARCH. PHARM. (WEINHEIM) 1968, 301(10), 750-62 * CN 21464-47-1, 21464-46-0 * ---	14,22	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. CL5)
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 72, 1970, page 385, résumé no. 43014m, Columbus, Ohio, US; M. LE GALL et al.: "Disubstituted amino alcohols of the omega-aminopentanol, -hexanol, and -heptanol series", & C.R. ACAD. SCI., SER. C 1969, 269(19), 1135-7 * CN 25622-48-4 * ---	14,22	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 13-02-1991	Examineur KISSLER B.E.
<b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b>			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. CL5)
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 72, 1970, page 366, résumé no. 111110s, Columbus, Ohio, US; & FR-A-1 575 005 (ASPRO-NICHOLAS LTD) 18-07-1969 * CN 27746-77-6 *	14,22	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 73, 1970, page 344, résumé no. 76968z, Columbus, Ohio, US; R. ROGER: "Five-membered nitrogen heterocycles", & C.R. ACAD. SCI., SER. C 1970, 271(2), 163-6 * CN 28220-71-5, CN 28168-73-2 *	14,22	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 77, 1972, page 485, résumé no. 34132z, Columbus, Ohio, US; & DE-A-2 148 551 (SANDOZ LTD) 10-05-1972 * CN 36848-51-8, CN 36861-03-7 *	14,22	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 78, 1973, page 400, résumé no. 159420u, Columbus, Ohio, US; & SU-A-363 698 (V.A. VOLKOVA et al.) 25-12-1972 * CN 41175-40-0 *	14,22	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. CL5)
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 86, 1977, page 499, résumé no. 120778g, Columbus, Ohio, US; & DE-A-2 628 469 (MORRIS, PHILIP, INC.) 30-12-1976 * CN 62247-39-6 *	14,22	
---			
-/-			
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lien de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 13-02-1991	Examinateur KISSLER B.E.
<b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b>			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons * : membre de la même famille, document correspondant	



Office européen  
des brevets

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Page 4

Numero de la demande

EP 90 40 3125

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 96, 1982, page 718, résumé no. 200124n, Columbus, Ohio, US; M.E. SAFDY et al.: "Tryptophan analogs. 1. Synthesis and antihypertensive activity of positional isomers", & J. MED. CHEM. 1982, 25(6), 723-30 * CN 81630-85-5 *	14,22	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 97, 1982, page 820, résumé no. 215838t, Columbus, Ohio, US; A. MIYAKE et al.: "Synthesis of 4-substituted isochroman derivatives", & TAKEDA KENKYUSHOHO 1982, 41(1/2), 14-23 * CN 83641-13-8, CN 83641-11-6 *	14,22	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 106, 1987, page 618, résumé no. 93757x, Columbus, Ohio, US; & DE-A-3 608 714 (MERCK PATENT GmbH) 25-09-1986 * CN 106832-85-3 *	14,22	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 98, 1983, page 401, résumé no. 4469f, Columbus, Ohio, US; A. MIYAKE et al: "Synthesis of 4-substituted 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline derivatives", & TAKEDA KENKYUSHOHO 1982, 41(1/2), 1-13 * CN 83752-58-3, CN 83817-82-7 * --- -/-	14,22	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
Lien de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 13-02-1991	Examinateur KISSLER B.E.
<b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b> X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

EPO FORM 1503 CLIX (P0402)



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 104, 1986, page 509, résumé no. 5597a, Columbus, Ohio, US; J. KNABE et al.: "Chiral 3-aminopropanols. II. N-alkylated products", & ARCH. PHARM. (WEINHEIM, GER.) 1985, 318(8), 727-35 * CN 98855-38-0,98524-67-5,98524-71-1 *	14,22	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 103, 1985, page 69, résumé no. 171929j, Columbus, Ohio, US; J. KNABE et al.: "Chiral 3-aminopropanols. 3. Action of 3-amino-2-methyl-2-phenylpropanols on guinea pig heart", & ARCH. PHARM. (WEINHEIM, GER.) 1985, 318(9), 832-6 * CN 98855-38-0,98524-67-5,98524-71-1 *	14,22	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 103, 1985, page 653, résumé no. 178002k, Columbus, Ohio, US; J. KNABE et al.: "Chiral 3-aminopropanols. I. Synthesis of the racemates and the enantiomers", & ARCH. PHARM. (WEINHEIM, GER.) 1985, 318(7), 593-600 * CN 98524-69-7 *	14,22	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 101, 1984, page 763, résumé no. 230442d, Columbus, Ohio, US; M. KOBAYASHI et al.: "Studies on the synthesis of antiulcer agents. I. Synthesis and antiulcer activity of imide derivatives", & YAKUGAKU ZASSHI 1984, 104(6), 652-8 * CN 93447-86-0 *	14,22	
X	DE-B-1 151 516 (KREWEL-LEUFFEN) * Exemple 3; CN 93721-04-1; exemple 6 * -/-	14,22	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 13-02-1991	Examineur KISSLER B.E.
<b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b> X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons * : membre de la même famille, document correspondant			



Office européen  
des brevets

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Page 6

Numero de la demande

EP 90 40 3125

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. CL5)
X	DE-B-1 261 862 (BAYER) * Exemples 3,11 * ---	14	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. CL5)
X	DE-A-2 148 551 (SANDOZ) * Exemples 4,11,12,15,16,17,22,31,38,41,42,43,48; CN 36848-55-2; CN 36861-23-1; CN 36848-56-3; CN 36848-57-4; CN 36848-62-1; CN 36860-96-5; CN 36861-04-8; CN 36861-07-1; CN 36861-08-2; CN 36861-09-3; CN 36848-52-9 * ---	14,22	
X	ARCH. PHARM., vol. 318, 1985, pages 727-735, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, DE; J. KNABE et al.: "N-Alkylierungsprodukte" * Composés de formule 3; CN 98789-37-8; CN 99412-66-5 * ---	14,15	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 79, 1973, page 438, résumé no. 66231p, Columbus, Ohio, US; H. WOLLWEBER et al.: "1-Arylperhydro-3-imino-3H-oxazolo[3,4-a] pyridines and related compounds. I. Stereospecific cyclizations of alpha,omega-disubstituted aminoethanols", & ARCH. PHARM. (WEINHEIM, GER.) 1973, 306(4), 284-99 * CN 42511-14-8 * -----	14	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 13-02-1991	Examineur KISSLER B.E.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons ----- A : membre de la même famille, document correspondant	

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**